

63318/B

0  
a. 18.

The Library of the  
Wellcome Institute for  
the History of Medicine

MEDICAL SOCIETY  
OF  
LONDON  
DEPOSIT

Accession Number

Press Mark

TERRANO, L.

T7



LAVRENTII TERRANEI

Ph. & Med. Doct. Colleg. Taur.

DE GLANDULIS UNIVERSIM,  
ET SPECIATIM

AD

VRETHRAM VIRILEM  
NOVIS.



TAURINI, M.DCC.IX.

---

Ex Typographia Alphonsi Joann. Bapt. Guigonii.  
Impressoris S. Officii.

*Superiorum permissu.*

Digitized by the Internet Archive  
in 2019 with funding from  
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30550646>




Illustrissimo Amplissimoque D.

D. IOANNI BAPTISTÆ DE AURIA

Marchioni Ciriaci, & Mari, Comit  
 Petrælatæ, & Dulcini, Vallis Ecclesiæ  
 Condomino, Domino supremo Testici  
 & Cefii, S. S. Mauriti, & Lazari  
 Majorum insignium Equiti,  
 Prioratus Ripaliæ Commen-  
 datario, Ducatus Augustæ  
 Gubernatori, & Ma-  
 gno Baglivo,  
 Et S. R. C. Castrorum Præfecto.

LAURENTIUS TERRANEUS

*Servus, Subditus, Medicus*  
 S. P.

 **USPICEM** *mibi novum non invoco, dum  
 aliquem AB AURIA Heroem mibi Pa-  
 tronum efflagito, Illustrissime Amplissime-  
 que Domine, Ab illâ videlicet Stirpe Nobilissima,  
 cujus in solo primam in lucem prodiisse, sub umbrâ  
 crevisse*



crevisse, cujusque Taurinum transplantatæ sequacem fuisse gloriari hoc quoque potest familia mea, fidelius subdita æquissimæ Dominationi, devotius addicta amplissimæ Dignitati, firmitus obstricta largissimæ Beneficentiæ, Excelsæ, Potentis, Nobilissimæ Domus Tuae, præcipui, ne dicam Unici, præsidii, & decoris meæ.

Terrere, fateor, tenuis hujusce dedicationis audaciam debuisset ipsa vel AURIACI nominis Magnitudo, ex ARBOREIS. a. Narbonæ Consobinis famitibus felicissimè Auspicati; Ab Amplissimis Urbis, & Classis Januensis Præfectis. b. magno regimine, multâ victoriâ Reipublicæ suæ utilissimis inclytè propagati. AURIACUM nomen, quod eternâ gloriâ illustravit alter ille Neptunus, c. Gallie, indeque Germaniæ exercituum Imperator Strenuus, Prudens, Fœlix: Reipublicæ suæ, Imperii, Fidei hostibus non modò, sed magis Fortune, & Patrie in Principem suum invocanti, invictus, magnanimus HEROS, quem Imperii columnen Melphidis Principatus cum grandioribus titulis à Cæsare collatus; Patrie Patrem, ac Assertorem æternum publicæ Statuæ decus, plaudente Civium gratitudine erectum, atque observatum: Seculi sui miraculum ac Virum incomparabilem plene eodem Historiæ. d. magnificè contestantur.

a. Ab Ar- doino San-  
sovin Fa-  
mil Illustr.  
b. Uberto,  
Conrado,  
Lamba,  
Pagano,  
Philippo,  
Luciano,  
Petro An-  
tonio, Tho-  
ma, Sanso-  
vin. Ibid.

c. Andreas.

d. Lorenzo  
Capelloni  
Hist.

Moratur Certè meam Patrocinii Tui ambitio-  
nem, VIR AMPLISSIME; illa, quâ suprâ  
communem

communem Nobilium sortem emicuerunt majores Tui, e. e. Fridericus Nicolaus, Raphael, duo Dominici, alter Nicolaus, Hieronymus. Dignitas Supremi Principatus, atque Domini Urbis, & Vallis, quæ licet ditionis amplitudine paucis inter Ligusticas, cæli profectò temperie, atque clementiâ, Soli amenitate, ac beneficiâ, populi frequentia, ingenio, fortitudine nulli cedit. Cujus dominium ut gloriosissimum, ac potens fuit Majoribus Tuis, atque Principibus, æquitate ac munificentia erga suos, rerum omnium ac præsertim militaris, in primis maritime præfecturæ peritiâ apud maximos Europæ Principes summo in honore habitis, f. ita ejusdem in Regnum sub-alpinum adjectio finitimis invidiosa, Sabaudis felicissima fuit: dum & prioribus bellis victa, sed fida, ultimò sola inter Sabaudo-Ligures sè solâ victrix, præsentì ideò intacta, Regno portus tutissimæ, Regiique Principibus asyli loco, gloriosissima semper stetit **ONELIA**

f. De quibus Aug. Justinianus Ann. Gen. Ughellus, & August. ab Ecclesia coron. Real. part. 2.

Preiosior tamen adhuc, quàm ditionis ad Regiam potestatem, visa est Familiæ Tuae ad Pedemontanam Aulam accessio: Illius nempe Familiæ, quæ ut Heroes (quorum dici seminarium potest) Celsissimis totâ Europâ Principibus suffecerat, omnes jam, seque totam devovit Sabaudicæ Augustis. Quam ideo grandium compensatione Feudorum, primariis Dignitatibus, muneribus, ac favoribus eximiiis excepere semper Regii Principes, Aula gratulationibus, Regnum universum amore, admiratione, plausu; utpote ad Regem columnis, ad Aulam ornamenti, ad Regnum felicitatis pars



*magna : Quod non modò in ATAVO , AVO ,  
ac PATRE TUO summis dignitatibus , Clas-  
sis Pedemontanae Praefecturis , Supremis Regii  
stabuli , atque Palatii Magisteriis , supremoque Tor-  
que decoratis toto coram orbe enituit , sed in Te  
Maximè , ILLUSTRISIME ATQUE  
AMPLISSIME DOMINE , in quo omnigenae  
eruditioni mirabiliter copulatur Rerum Militarium  
peritia singularis , ac magnanimitas , ut in armis  
tum Caesareis , tum Sabaudis bello Hungarico , &  
Pedemontano , ibi catholicae Fidei Voluntarius  
Miles , hinc Praetoriae cohortis Subcenturio , ubi-  
que Heroicus Caesaris , atque Victorii Magni  
triumphos promoveris , Tuâque ex parte fece-  
ris ; cujus Natalium Granditas , alloquii Or-  
natus , actionis Magnificentia , atque in pu-  
blicis , Aulicis , Regiisque negotiis Peritia  
Maximè claruit in illis tum ad Christianissimum  
Regem , & Burgundiae Ducem , tum ad Philippum  
in Hispanias amplissimis utriusque nuptialis feli-  
citatibus Legationibus , magno triplicis Aulae , Gallicae ,  
Hispanae , Sabaudae consensu , gratulatione , plausu .  
Hinc accessit Nobilissima dignitas Gubernatoris ,  
ac Supremi Praetoris Ducatus Augustani , & Ca-  
strorum Praefecti . Hinc majora parat Princeps ,  
plura parat Fortuna ; Ille ut Dignitatibus parem ,  
Haec ut Dominiis ampliorem faciat Majoribus  
Tuis , ut meritis parem agnoscit , & quôque Ma-  
jorem .*

*Petere*

*Paterco ( quos præterire mea non potest erga  
Ipsos reverentia) Illustrissimos ac Reverendissimos Thomã ,  
Abbatiarum Præsules PATRUUM ac FRA- Alexandrũ  
TREM mentis sublimitate, animi magnitudine, mo-  
rum nobilitate gravissimos, & ornatissimos Viros, qui  
Doctrinæ præstantiam, virtutis splendorẽ, Religio-  
nis dignitatem, Auctoritate, exemplo, specie ipsa  
sustinent, confirmant, extollunt. Prætereo ex Fra-  
tribus Tuis Amplissimis illum militaris scientiæ, ope- Paulũ Do-  
ræ, dignitatis Peritiã, prudentiã, strenuitate He- minicum  
roem, opere fortissimum Militem, Dignita- Hyacin-  
te meritissimum Equitum Catapultariũ Ma- thum.  
gistrum, & Supremum turmarum Ducto-  
rem. Nec non CAROLUM FRANCIS-  
CUM Hierosolymitanum Equitem generosissimum,  
Dertonæ Commendatarium, qui in bello Pelopon-  
nesiaco pro Religione, in Pedemontano pro Subalpi-  
no Rege fidissimus, prudentissimus, ac strenuissi-  
mus miles ac Ductor fuit. Nec patitur justa Te ad  
loquentis Epistolæ brevitatis ut debitã prosequar  
laude Primogenitum egregiæ, præclaræque indolis  
Filium, qui Gloriæ, & grandioribus Aulae Digni-  
tatibus adolescens, magnis jam virtutibus orditur  
Virum, scilicet Patrem.*

*Ut Patrias Laudes Sentiat esse suas.  
Atque Secundo-genitum.*

*Mens Cui sublimis supra genus eminet  
ipsum.*

*Grandius ingenio nec sibi nomen inest.*

*Præclara*


*Martial.  
lib 6  
Epigr. 38.*

*Ovidius  
eleg 3. de  
Ponto.*



*Præclara Majorum gesta se ipsis æterna, imitatione perennaturi; Rerum, bonorumque Studiorum omnium Scientiâ, virtutum omnium, maximèque equestrium cultu.*

*Andax profectò, qui velit immensum Familiæ Tuae decus ingenti etiam Volumine complecti; ineptus, qui brevibus scriptis attingere: Mibi is unice animus fuit ostendere quot fuerint Majoribus meis, quot mibi adsint Patroni, quantus ex his Tu maximus mibi rebusque meis Mæcenæ occurras, quem majori ex susceptis Beneficiis fiducia exorare possim, atque sperare ut tenue hoc non voluntatis obsequium modò, sed debitum, humanitate suscipias; Splendore ornes, summæ authoritatis Clientelâ tue aaris, permittens libellum illo nomine illustrari, quo Amplissimæ totâ Italiâ Familiæ Illustres spectantur. Inter quas semper emineat Tua, in qua Tu Vigearis diu.*



## PRÆFATIO.



ES, quam aggredior, ut non temere omnino suscepta videatur, ut tota pateat; velut candidè scribenti par est, legenti non inutile penitus, saltem non adeò grave: præfari primùm juvabit occasionem, quæ fuerit tentandæ, modum, quis inventæ ac inveniendæ Rei, quam hoc aditu facto intimiùs penetrabo, fusiùs exponam, oculisque subiiciam.

Inter privatam Anatomen, cui quoddam adesset non utilitatis minus quàm honoris capiebam, forte contigerat, ut de propudioso Gonorrhææ morbo, ejusque sedem potissimùm incideret sermo. Inter multiplices, quæ in medium affererentur, sententias, altera erat quæ Gonorrhææ sedem Prostatas assignat, altera quæ ipsam Penis substantiam; hæcque Sydenhamii, <sup>a</sup> quam fusiùs exponit Mu-

Operis  
Occasio.

<sup>a</sup> Epist. ad  
Henr. Pamã De Luis  
Ven. hist. &  
cur.

A

sita-



<sup>b De Lue sit anus, b</sup> diverso tamen theoremate. Pri-  
<sup>ven. lib. 3.</sup> ma communi opinione recepta mihi ma-  
<sup>c. 2. de Go-</sup>gis arridebat; pro secunda tamen, quum  
<sup>norrb.</sup> *Sydenhamii* magna esset apud me & gra-  
vis auctoritas, propter eximiam Viri in  
Re Medica prudentiam, & scribendi  
candorem cum gravitate conjunctum,  
pro Egregii, inquam, Viri sententia te-  
naciùs aliquandiu contendebam, ut ean-  
dem sua probabilitate donarem, & ad  
veri similitudinem aptè se habere de-  
monstrarem: eo maxime quòd facilius  
videretur venerea miasmata, per occur-  
rentes facilè poros, Penis substantiam  
subire, quàm totam Urethræ longitudi-  
nem tranare, & in imos profundè aditus  
agi, ut Prostatis labem inferrent. Donec  
dubitare cœpi de sententia plurimas ob-  
rationes, tum quas sapiens illud collo-  
quium, tum quas meæ-met meditatio-  
nes obtulerant: atque ob illam præ cæte-  
ris, quòd minimè assequerer quibus viis  
a Penis substantia, ulcerosâ diathesi, affe-  
cta saniosum istud, ut putant, in Ure-  
thram exstillaret. Cœpi etiam desiste-  
re a sententia, quæ mihi eò videbatur  
obscu-

obscurior, quò examinabatur attentius: Immo jam planè destiteram, nisi altiùs adeò insedisset menti *Sydenhamius*, ut minimè quiescere animo possem, ni, vel repudiandæ vel confirmandæ sententię, Encheiresim adhibuisssem, qua in suspectis Venere hominum cadaveribus, an saniosi quidpiam in Urethram erumperet, in minùs suspectis, an pusilluli forte meatuli, seu poruli saltem se se proderent ad *Sydenhamii* conjecturam desiderati, attentè perquirerem, & quod in Re Physico-Medica momentosum est, certos in alterutra parte Sensus efficerem.

Eam ob rem, quum Amicorum quorundam suasu, & Studiosorum rogatu, elapsò nuper annò Anatomicis vacarem, postquam Partes Genitales more Graaffiano exposueram, ac adnotaveram in dato cadavere Spermaticam sinistram Arteriam a sinistra Arteria Emulgente duplici ramo derivatam, laudatìs inventìs Graaffianìs, placuit Urethram seponere, & in Musæum deferendam jubere.

M.DCC.I.



Detectio.

Ergo diffissam a parte superiori longitudinaliter Urethram, & undequaque inspectam, subductoque compressam digito gemmare ab ostiolis plurimis liquorem sub-viscidum, & ex albo leviter sub-luteolum miror. Hinc avidissimos intendens oculos repetita compressione ad ulteriorem succi emunctionem Urethram sollicito, varièque pertracto; donec passim turgentes, passim emuncti se se apertissimè fassi sunt canaliculi, clarissimèque constitit, non morbosum id aut fortuitum quidquam, sed maximè constans esse Naturæ artificium, ut aliæ confirmarunt Urethræ, quarum satis ingentem nobis copiam faciebat *Scantius*, Primarius nunc Legionis Pedemontanæ Chirurgus, cui primò ista communicabam: Atque in expositas frequenter Urethras repetito contuitu, semper indaginis tœdium fonticulorum copiâ, quasi fœnoris quadam exactione pensabam. Hinc toto oculo sequaci Urethram observans, supra Urethræ medium guttas duas reliquis supra-notatis majores, duobus hæsitantes forami-

raminulis curiosè notabam. Tum detecti ostiis indicantibus Fluentuli, iisque adacta tenuiori setula permeatis, totidem Fontes, seu Glandulæ duæ; prætereaque præsides veluti istorum fontium Najades Pseudo-Sphincteris musculi fibræ, quarum imperio lubituque fluxurus juxta diversas necessitates, diversa quantitate, variòque modò liquor ministraretur. Et demum ista versantibus nova occurrebant Prostatarum ostiola, unà cum reculis aliquot observatu facilis, ultroque obviis.

Hæc sanè ut exigua, ut levidensia prosequi, & Publico exponere nimis vanum ineptumque dubitassem, nisi Philosopho Medico nimis indignum videretur, Deo auctore inditam homini minimam licèt particulam, ut inane quidpiam & nullius momenti despicere, aut saltem negligenter spectare, quam potius ut suo plenam artificio ac utilitate machinulam, ut suis quoque morbis obnoxiam, omni excolere studio Mirabilis machinæ observatorem, & restauratorem Medicum decet. Hòc si oculo  
ista



ista conspicias nihil in iis abjectum, & vile, nihil obscœnum videbitur, quo vel candidior lædi possit modestia, aut nequissima utcumque proritari impudentia.

Vides Humanissime Lector, quid occasionis huic invento fuerit, quid causæ, cur ejusdem, si non pretium, saltem rationem aliquam a me habendam putaverim; illoque Publicum fraudare minùs æquum judicaverim, hoc potissimum sæculo, ut sapientissimo, sic Rerum Anatomicarum studiosissimo. Levissimis & tenuibus etiam rebus pondus & pretium aliquod novitas ipsa, immo dignum humanæ mentis, humanisque rebus aptissimum curiositatis ingenium conciliat; In rebus potissimum Anatomicis, quarum nulla est tam nauci tam nihili, quæ (cum præsidem humanæ salutis scientiam semper illustret amplifcetque) non sit cum aliquo hominum fructu, ac utilitate conjuncta.

Certè non inutile penitus hoc tenue quantumvis inventum fore confido aliquot istarum partium morbis, Gonorrhæis



# PRÆFATIO.

7

rhæis puta, earumque symptomatibus meliùs exponendis, forte etiam tutiùs curandis; quod mihi per litteras candore, ac eruditione refertas (quibus me & honore, & voluptate cumulavit) plenè autoritate verbis confirmat Vir celebri nomine meritò spectatissimus Georgius Baglivus: *Glandulæ Conglomeratæ, & Disgregatæ a Te detectæ circa Uretbram virilem, viam satis amplam aperiunt, abstrusas investigandi causas quamplurimum Vesicæ, ac Penis Catharrorum, qui usque adhuc in recondito latent. Quem-ad-modum èt ille qui in Magna-Græcia Academiæ Incursorum, Pythagoricis quondam scholis æmulæ, nomen primus, dignitatem præcipuus, immortalitatem præ cæteris unus dedit, Hyacinthus Gimma Dignus certè vicissim totidem laude sapientum, quot Ipse Reipublicæ litterariæ Proceres, Academiæ Socios, inter quos eminet, magnifica laudatione prosequitur, in nobili opere, a ubi*

a Elogj Academic

*Il nome altrui ad immortal memoria*

*Con sua penna sublime erge alle stelle.*

atque disertissimo me Elogio magnificentius excipiens.

Co-

Imit. De  
Lemene.

*Così gentil fa al glorioso stile*

*Soggetto vile, onde virtù si scopra,*

*Le mie rozze sembianze, e il nome umile*

*Perchè quallora alti prodigj adopra,*

*Elegge al suo lavor materia vile*

*Fabro, che vuol che sol s'ammiri l'opra.*

Cujus maximum sapientiæ, & quæ summæ sapientiæ est, animi, erga sapientiæ cupidos, facilitatis beneficium, quoddam studia mea, summa laude, videlicet suâ, & liberali munere gloriosius, & suavi stimulo potentiùs promovere peramanter voluit, gratus agnosco. Vir inquam Amicissimus & Eruditissimus sic: *aprendo largo campo a' Filosofi di poter non solo rinvenire molte cose forse sin' ora ignote intorno all' emissione del seme, e dell' urina, che per l' uretra si fanno: ma anche su le cagioni de' mali, che alla giornata sogliono in essa avvenire.* Gemmeum quoque calculum suum conferentibus Viris Sapientiâ, Dignitate, Nomine Amplissimis, Luca Tozzi Innocentii XII. Pont. Max. olim Archiatro, Luca Antonio Portio Medico Cæsareo, Agnello De Neapoli, Illustrissimæ Academiæ Sociis non di-



cam spectatissimis, sed Patribus optimè meritis. Id etiam per litteras, quibus mihi gratificari placuit, humanissimas confirmarunt, Medicis scientiis & politioribus litteris ornatissimus *Nicolaus Lanzani*; & propter singularem animi candorem ac eruditionem amicissimus *P. Matthæus a Cadratio* Ordinis Capucinatorum, Medicus Taurinensis, Academici laudatissimi; nec non Phlebotomiæ Vindex Felicissimus, & de Re Medica optimè meritus *Matthæus Georgi*, in scientiis non minùs, quàm in Albinganensi Civitate Patricius; & demum Vir eximiis laboribus promeritâ nominis famâ nulli Clarissimorum hujus Ævi Medicorum secundus *Jac. Mangetus* velut Coronide exornavit.

Tanto Sapientum favori ut, imparibus licet, datis tamen, additisque ipsorum auctoritate viribus quoquo modo respondeam, præsentium Glandularum statum præter-naturalem indagare saltem adnitar statim ac, quam instituo tractatiunculam statûs earundem merè naturalis observatione contentam explevero.

B

Quod

Quòd si meam hanc tractationem ut multipliciter vitiosam insimulas, facis quidem pro ratione, cui me candidè assentientem habes, non tamen pro humanitate Tua, qua Te ignoscentem velim, *Lector Benevole*, quæ præcipua mihi alioquin fuit timidum hunc libellum in publicum producendi spes & fiducia, quem ut Tibi minùs molestum facerem, minorem feci: *succinti quæ sint bona libelli* ipso edoctus *Martiali*. Nec magnum aliquid ut a me expectes, mea tenuitas, juvenilis ætas, & perversa rerum mearum conditio permittunt. Ultimò, si mihi Zoilum liceret suspicari, monerem:

Aptatur  
Martialis  
Epig. 1. ad  
lib. 2.

Martial. in  
Xen. Epig.  
2.

*Ne perdas operam, qui se mirantur, in illos  
Virus habe: nos hæc novimus esse nihil:*





## CAPUT I.

*De Glandulis Disgregatis  
in Genere.*

**Q**uemadmodum aeri terræque, leni humectatione ac refrigeriō temperandis ac refocillandis, in suavem rores asperginem, ac tenuem in guttulas minutissimas pluviam distillavit Natura, fertiliorem jucundio-  
 remque longè, quàm ubi gravius æther ingentibus nim-  
 bis vasta colluvione terras inundat. Ve-  
 lut peritus hortorum cultor viridarium aptè rigaturus, non in unum largumque sinum agglomeratas in hortum aquas derivat, ne unus, vel officiat toti exundans, vel parti deficiat exiguus; sed in plures discretas canales undam deducit, & multifidas riguo meatu venas distribuit, & quot areolas, tessellas, ac pulvinos, quot demum strias, ac liras, tot aquæ ductuum propagines ac diverticula prope infinita instruit, areolis rivulos, sulcosque liris interponendo: Atqui studiosior culturæ suæ, ubi vel soli, vel cœ-

Glandularum disgregatarū.

A simili.

li vitiô, fluentulum aut imbres denegentur, utriusque defectum curiosius supplet hydriis ~~multiplici~~ foramine imbri-feris.

P. Alex.  
Don. lib. 2.  
cap. 5.

*Unde pluit tenuis rivis rorantibus humor.*

Ufus

Qualem, inquam, se se in Universo, plausibili magis apparatu, qualem in hortis cultor, laudabili industria, talem, nec minori utilitate vel sapientiâ se se gessit Natura in rebus animalibus, ubi mirabilis opificii plena sunt omnia. Nimirum ubi cavitates aut canales, aut quæ cavitare vel canali continentur, aut fluunt, humectandi ad mollitiem, & cum molitie, contenta ad dissolutionem, & fluxum, continentia ad flexibilitatem, lubricandi ad facilitatem diffluxus, obli- niendi ad temperiem, ac munimentum acrimoniæ, ac impetûs, incumbit necessitas, vel suadet istorum, & qui ab hisce pendent, usuum oportunitas, utilitasque, nihil frequentius molita est Natura, quàm quo nihil sapientius poterat excogitari.

Descri-  
ptio.

Nempe ad cavos parietes fonticulos excitat plures, scrobiculos exculpit, rivulos



vulos molitur, plurimos adeò, ut locus bellè irriguus ubertate fontium occurrat; ad breviam invicem intervalla ita digestos, ac si ad exiguas quasque areolas sui aptarentur trepidanti venâ siphunculi; tenuiter adeò suaviterque lymphulas evolventes suas, ut humentia velut quandoque cryptarum tophina molli- bus guttulis, flere cavitatum animalium parietes facilè putes; molliter adeò minutas rorant guttulas, & in cavitatem, velut in cratera reciproci miscent blandè cadentes liquores suos. Hîs mediis sapientissima rerum Natura ex ipsa glandularum & canaliculorum multiplicitate præclarè sibi compendium efficit, operationibus suis facilitatem, promptitudinem, & perfectionem.

Cogita enim humectandam & obli- niendam esse superficiem aliquantæ latitudinis per quod velis liquidum. Certum est toti illi quaquaversum latitudi- ni induci debere saltem humidam su- perficiem velut humoris laminulam. Jam id præstare tentato per liquidum, non

Ratio.

uni-



ex absur-  
ditate op-  
positi.

unico fonte uberiùs promanans: Putas ne eâdem facilitate ac celeritate perducendum per latitudinem humectandæ superficiei liquidum uno fonte unoque ex loco erumpens, ac in plures guttulas ex multiplici scaturigine depluens? nequaquam, si sapias; sed uno profluens rivulo, vel totum implere cavum debere, si concavam, vel saltem abundantius profluere, si convexam planamve superficiem allambere debeat; utrinque frustraneum, aut super-abundans multisque modis incommodum in cavitatibus, quæ liquoris copiam, vel exterius apertæ concipere non possunt, nec debent, vel nimium sensiles non patiuntur, vel locum liquidis aliis aut solidis permissuræ, nequeant admittere, aut sine laxitatis aut nimix adjacentium compressionis periculo diutiùs detinere.

Aliter uno deductum stillicidio; vel perpendiculariter in cavum excidens, vel modicô oblique vagèque proserpens rivulô, exiguum sanè spatii alluendi pertingeret, pluraque saltem relinqueret velut in mari breviora, arentia penitus  
& ex.

& exsucca, tantum abest ut per universam perducatur superficiem, eamque exactius investiat, quod erat genuino operantis naturæ modo maximè consentaneum.

Quin etiam si abundantius foret glandulare liquidum nec id præstaret usum quibus destinatur, in Cavis, quæ liquorem aliquem stimulandi aptum continentia mucosò interiùs oblinimentò muniri debuerant: namque glandulæ rivulus liquori cavitæ contento perfusus, eundem quodam-modo quidem mulceret, sed cavum parietem non obduceret: quare nec satè tutum probèque munitum erit a stimulo continens cavum, nec illæsum, & a permixtione sincerum, contentum liquidum, ut fieri maximè oportuisset.

At plures etiam fontes eosque dispersos, sed tractibûs longioribûs diffitos commiscere: spatii resistantiâ fiet, non modò ut distantes difficiliùs, sed inæquali resistantiâ, etiam ut inæqualiter & imperfectiùs omnes superficiæ partes obliniantur: siquidem vagè fluens liquidum

ad



ad has partes excidisset, ad has hæreret, ab illis substitisset, prout resistentiæ, hæque inæqualiter occurrentes permitterent, aut cohiberent: Unde non universa superficies, sed aliquæ solùm ipsius partes humectarentur: Igitur multò difficilius ac inæqualius ageretur huiusmodi liquidum per spatia longis tractibus ementienda, seu majori labore veniret in humectationem & oblinimentum datæ superficiei.

*Necessitas.* Quare facilitatis semper & perfectioris numen Natura, & exactæ, & expeditæ cavitationum humectationis ac delinitionis studiosa, liquidum mulcens perductura per universam superficiem canalibus aut cavitatis, hoc utetur artificio: quod est, totum spatium humectandi corporis dividere in spatia plura & minora, & Glandulas in massulas plures & minores, ut quocumque velis loco obvius & paratus humor occurrat, & per exiguum utrasque glandulas inter-jacens spatium faciliè agat sese; atque hunc in modum habeatur expedita, & perfecta humectatio, & oblinimentum illius  
dati

dati corporis & superficiei: quum per hanc disgregationem, seu disjunctionem fiat, ut liquidum intra breve temporis spatium agi possit supra omnes humectandi corporis partes minimas, quod intra spatium temporis multò, ac multò longius succedere non potuisset, non diviso corpore in plura spatia, & glandulis in plures massulas. Sed èt est perfectior humectandi obliniendique modus, redactâ humectandâ superficiei velut in areolas, & inter brevissima spatia meatu frequenti constituto, perductôque affatim liquidò: Ita enim fit, ut divisa illa superficiei in plura spatiola, & ad unumquodque spatiolum constituto latice, fit, inquam, ut nulla pars datæ superficiei effugere liquidum possit, & non humectari.

Quo-ad  
Cava.

Quòd si in illo canali, aut cavitate contentum emolliri, dissolvi, aut quoquo modo debeat modificari, fiet quidem ut per glandulas hujusmodi requisitum liquidum in cavitatem depluat, ac deponatur eo modo, quo per unum ductum fieri potuisset; sed insuper erit

Quo-ad  
Contenta.



peculiaris & aptior circa contenta liquidi agendi modus : persimilis admodum operationi, quæ Chymicis stratificatio nuncupatur. Nimirum velut illi ut corpus aliquod difficilius solubile facilius solvant, solvendum corpus in laminas plures, & quò possunt tenuiores secant, quas ita alias aliis super-struunt, ut duo quotque solvendi corporis plana alterum fermenti planum inter-mediet, sicque ex solventis solvendi que corporis stratis, alterna serie dispositis, aptissima operationi chymicæ strues contignetur ; ut fermentum solvendo corpori copiosius permixtum, minimas lamellarum altitudines utrinque, & facile subeat, dissolvat, inmutetque. Ita in animalibus glandulæ per longitudinem canalidis digeruntur, ac veluti stratificantur : nempe inter duas quasque moles contenti corporis constituitur glandula, & singulæ moli contenti corporis suis accommodatur siphunculus, ut, non totâ massæ confuse, & rudi quodam modo, sed partibus singillatim exactius inmisceri, & suas agere operationes glandulare liquidum posset.

Quo-



Quoniam rursus partes quam-plurimæ  
liquidi copiam satis ingentem sibi, &  
operationibus suis exigunt, quæ si ab  
unica peti glandula debuisset, grandior  
illa, & quibus hæreret, aut adjaceret  
partibus, gravis & molesta nimium fo-  
ret: velut si glandulæ Ventericulum aut  
intestina irrigantes in unum congestæ,  
glandulam constituissent Ventericulo, aut  
partibus vicinis affixam, grandior pro-  
fectò quæ exurgeret moles, eidem par-  
tibusque vicinis negotium facesseret;  
quod in amplitudinem cavitatis, &  
canalis longitudinem distributis, planè  
est nullum.

Utilitas

Ex copia.

Cum etiam cavitates assiduo madere  
liquore sit necessarium, ita comparatæ  
ad cavitatem esse, glandulæ debuere ut  
quolibet momento adesset præsto, &  
facilis flueret liquor; ubi potissimum ner-  
væ incurrens membranæ stimulus, sui  
obtundendi, membranæque leniendæ  
necessitatem fecerit; per Conglomera-  
tas autem, utpote magis a tunica stimu-  
lata distantes, non statim adèd præsto ef-  
se liquidum potest, ut a Disgregatis, quæ

et facili-  
tate liqui-  
di emun-  
gendi.



vel in ipsa met nervea tunica sunt insculptæ, aut saltem eidem immediatè subjectæ, ut datâ vel minimâ nerveæ tunicæ vibratione, tensione, aut corrugatione, ipsæ agitentur comprimanturve glandulæ, vel saltem exigui concutiantur excretorii canaliculi, unde faciliè deciduus proritetur humor ac sollicitetur, leviter provocatus e fistulis manet, nec guttis impluat modò, sed repentinis quandoque torrentibûs influescat.

Exprimen  
di.

Rursum quum pleraque, sin omnia minùs, Cava adjacentes habeant Potentias seu advolutos villos contractiles, ut motus illa suos exerceant; compendiarie semper Natura voluit eâdem contractilitate (quæ alioquin erat necessaria) uti ad compressionem Glandularum. Dum Ventriculi, ex gr., ex *Malpighio*<sup>f</sup>, & Intest. minorum, ex *Bohnio*<sup>g</sup>, nervea interiorque tunica a Carnea in rugas insignes contracta assiduè detinetur, assidua compressione a subjectis unâ Glandulis liquor promulgetur, crescenteque identidem contractionis unâ & liquoris necessitate, uno eodemque momento, utrique fit satis.

At-

*De Struct.*  
*Gland. ad*  
*Soc. Reg.*  
*Angl. Epist.*  
*g Circ.*  
*Anat.-phys.*  
*Progymn.*  
*XXIX.*



Atq; Hujusce generis glandulis quàm minima sufficit potentia? utpote quarum planum totum plano fibroso, singulæ singulis fibris adjacent, aut ambiuntur, amplexanturve, quæ ex molli, cedente, facilimeque compressili loculo constant, quibus quàm parva per brevissimam Excretorii longitudinem resistentia? quum Glomeratæ & extracavitatem sitæ proprias, & sibi invicem profundius inmixtæ, & Excretorio longiori præditæ, majores sibi potentias adscivissent. Nec addo quid compendii sit ex eo, quod Disgregatæ peculiaris sibi vasa sanguinea & spirituosâ non exigant, sed ea sibi accomodent quæ sunt nactæ partium adjacentium occasione.

Etenim verò nulla frequentior esse Glandularum structura, & dispositio potest, quàm quæ non modò, quo ad operandum usibus aptior suis, non modò in exterioribus adjumentis, sed in suo-met machinamento simplicior. At quæ simplicior esse glandularum structura vel dispositio, quàm Disgregatarum

Ex simplicitate.



h De Stru-  
ctura Glandul.  
Gc.

rum potest? quibus structuram simplicissimā decrevit, Omnium decretō summus Naturæ Dictator *Malpighius*,<sup>h</sup> atque illud facilè evincit, quod aliæ secretrices glandulæ in istas resolvantur, ita-ut quod in Conglomeratis non nisi longo labore attingimus intimam dissolventes texturam, ut folliculos glandulosos, quibûs Conglomerata compingitur, retegamus, in his statim occurrat, facilis res, nullius arduæ obscuræque compositionis, ut nullum majus structuræ compendium possit inveniri.

Disgrega-  
tarū enu-  
meratione  
Epilogus

Patet itaque Glandularum Disgregatarum necessitas, ac utilitatum summa, ut pateat ratio cur Natura has structuræ in animalibus frequentius adhibuerit; frequentius inquam in Cute universâ *Miliares Stenonis*, in Naribus, ut pridem attigerat *Schneiderus*<sup>i</sup>, & nuper diligentissimè descripsit *Clar.*<sup>mus</sup> *Vieußens*<sup>k</sup>; in Aurium Aquæ-ductu & Meatu auditorio, quas elegantissimè delineavit *Præcl.*<sup>mus</sup> *DuVerney*; in Palato, Faucibus, basi Linguae, Epiglottide a *Nic. Stenone*<sup>m</sup>; ad Trachæam<sup>n</sup>, & Oesophagum<sup>o</sup> à *Vvilli-*

i De offe  
cribrif. G  
sensu ac org.  
odor.

K De cereb.  
Cap. xvi.

l De Aud.  
org.

m Observat.  
Anat. de  
glad.oris Gc

sis; ad Ventriculum a *Vvepfero* p; ad Intestina a *Peyero* q, detectas; ad Uterum r, Pericardium, Pleuram, Peritonæum ex observatione *Malpighii* s; ad interiorum tunicam Vesicæ biliaris ex *Malpighio* s, & Urinariæ ex *Dan. Taurvy* t, nec non & Uretheris; in Arteriarum, Venarumque ex *Vvillisio* u, fortè etiam Lymphæ-ductuum tunicis ex observationibus oculatissimi *Nuck* v, millenisque aliis in partibus animalium, ut passim observant Anatomici.

Frequentissimo huic Glandularum populo propriam assignari Coloniam debere censerem, eamque amplissimam ab iis non uno seclusam discrimine, quibus tota glandularum universitas latioribus velut provinciis, alterâ in Conglobatas, alterâ in Conglomeratas dispescitur extentis magis finibus ambituque, a *Sylvio* primùm, indè communi Anatomicorum consensu censita. Eòque humaniùs id mihi permissum iri confido, quod hanc quam instituo specialē glandularum divisionem, eo fine acceptam & cohonestatam velim, ut confusa alioquin moles

gland.

n De respir. org. & usu Dissert.

o Prim. viar. descrip. p Miscel.

lan. curios. Germ. observ. 251.

An. 2. & Cicut. aqua. Hist.

q Exerc. de Gland. Interfin.

r Dissert. De utero & Vivip. ov. &

[De Struct. Gland. conglob. Ad Soc. Reg. Angl.

Epist. t Des usage. de la struct. de l'homme

Chap. x. u De respir. org.

v Adenograph. curios.



Disgrega-  
tarū à cō-  
terisseclu-  
sa Provin-  
cia.

glandularum universa in partes tribua-  
tur, quarum unaquâque decenter con-  
tractâ, rite secretâ, prudenter digestâ,  
singulîs suo donatîs loco, suo dispositîs  
ordine, Glandulare agmen eâ, qua nul-  
la aptior ad claritatem conciliandam  
methodus, divisione videlicet ac distri-  
butione illustretur. Neque enim exara-  
tæ modò glandulæ a Conglobatis &  
Conglomeratis minùs, quàm illæ inter  
se invicem disconveniunt, ut quemad-  
modum vulgò duplici, sic etiam triplici  
in glandulis diversarum proprietatum  
conventu, interventuque scissa glandu-  
larum societas, tribûs æquè ac duabûs do-  
nari provinciis commodè possit.

Corp. Hum.  
Anat. Tr. I.  
c. VII.

Ecquis enim est qui glandulas istas ve-  
lit e genere Conglobatarum ut Phil.  
*Verbeyen* Subcutaneas? quum tanta sit  
istis in exteriori forma, interiori structu-  
ra, liquore, canali, officioque discrepan-  
tia. Aut quis inter Conglomeratas re-  
censeat? quarum-met nomen plurium  
glandularum in unam, plurium Excre-  
toriorum in unum coeuntium collectio-  
nem importat, ut istis quæ singulares

omnino sunt, aptari minimè possit.

Quamobrem cui magis quàm *Malpighio* assentiar est nemo, Qui licèt eâ quâ erat puriori, sincerâque intelligentiâ venâ Naturæ simplicitatem, cui erat apprimè factus, presso sequutus gradu, inter glandulas omnes analogiam instituerit, tres tamen glandularum species agnoscit, & præter Conglobatas, ac Conglomeratas, tertias facit Miliares, quibus *Palatum, Oesophagus, Intestina, & consimiles partes* copiosè ditantur.

*De Gland. Struât. ad Soc. Reg. Angl.*

*Es Oper. possib.*

Hæ Disgregatæ seu Miliares glandulæ, aut earum saltem pleræque ex illarum sunt genere, quæ Vesiculares communiter appellantur ab Anatomicis. Ex *Vesepfero* quippe & *Peyero* constat ventriculi & intestinorum glandulas, ex *Malpighio* Miliares omnes glanduloso folliculo seu cameratâ in vesiculam peculiari membrana, aptâ cribrationi peculiaris fluidi simplicissimè integrari.

*Disgregatarum plerarumque structura.*

Hinc *Alexander Pascoli* qui *Hetrusco* sermone

*quæ Latii jam sæcula prisca,*

*D*

*Et*

*Th. Costa  
Jes. Puss  
Poem. l. VI.*



*Et Grajas veneres fandi dulcedine vincit,  
miris eloquii modis, quibus scientiæ dul-  
cescunt, lepôrem Charitesque omnes  
Rei Anatomicæ invexit, suavi perfun-  
dens venâ*

*Nectaris ætherii, longè super Attica mella.*

Ut quæ Italiam, apud quam post  
barbara sæcula ita primùm est instau-  
rata, ut in eâdem primùm nata videat-  
tur, in patriam agnoscit, patrio sermo-  
ne Italiam se se ( ut cæteræ scientiæ )

*Il Corp. Um.  
l. 1. part. I.  
Cap. XIII.*

ostentaret Anatomes. *Alexander* inquam  
*Pascoli* ( qui non ingratham hujusce di-  
gressionis occasionem fecit ) ad rem  
nostram aptissimè. *Ma degno di rimar-  
co si è in coteste ultime ( idest vescicolari )  
che il sangue, e gli spiriti animali, di ma-  
no in mano, che bagnano le pareti delle  
vescicole componenti, vi depongono un cer-  
to licore particolare; il quale gemendo nel-  
le loro minutissime cavità, ivi insensibilmen-  
te si accoglie, per poscia trapelare in al-  
cuni canaletti insensibili.*

Namque peculiaris structuræ mem-  
brana illa, qua Miliæres excitantur in  
plerisque, sin omnibus, Animalium par-  
tibus

tibus in planum extensa non fuit, ita <sup>Structuræ ratio.</sup> ut Intestinorum ex. gr. aut Urethræ interior paries vel totus, vel debitis intervallis, ipsa esset glandulæ substantia, ipsaque eorum cavitas, communis excretorii canalis loco esset, ut intendere videntur quoad Intestina *Glissonius*, quoad Urethram *Diemerbroeckius*, utque fieri facile potuisset, & fortè etiam in partibus aliquibus factum, puta in Pleura, Peritonæo & consimilibus. Neque id quidem incongruum, si foret: ubi tenuissimus, exiguusque liquor, seu velut mador perspirationis instar continuò sufficitur, atque ubi membranam illam nihil incursat, aut super-excurrit naturaliter, quo deteri, obstrui, vel quo-modo-libet lædi glandularis textura faciliùs possit; quod tamen quum in locis animalium plerisque graviùs timendum foret, nec-non aliqua continuò, majorque identidem liquidi copia exigeretur, nec superficialiter tantùm excavatæ, nec granuli in modum solidæ atque compactæ, vel nullo vel exiguo præditæ conce-



ptaculo apponi glandulæ debueret, ex quibus ( nihil vel sanè parum liquidi concipientibus ) statim a secretorio in locum depositionis suæ, in Urethram puta, vel Intestina, continuò vel nimis exiguum vel extemporaneum deplueret liquidum; sed in marsupium velut efformatæ, quæ plusculum liquidi concipiant, ac velut in gurgustio servent tantisper, debitis temporibus, aptaque ad exigentias quantitate erogandum. Quin etiam per factas in cavernula morulas inspissari aliquantulum cogique liquor poterit, & gluten assumere, quo partibus lubricandis hæreat magis, easque melius obducatur, quod in glandulis vesiculosis passim observamus.

Disgrega-  
tarum uni-  
versim va-  
rietates.

Est ut hæc Glandulas alibi majores, alibi minores, alibi magis strigosas, alibi corpulentiores observes, quæ parent ex superioribus; alibi etiam magis, alibi minùs diffitas, alias in racemum collectas, aut confertiùs saltem stipatas, ubi nimirum ad singulas canalium aut cavitatis sectiones minùs, magis ad

ad aliquem tractum est liquidi & quidem majoris necessitas, ut in tenuibus Intestinis, orificio Vesicæ urinariæ & consimilibus.

Quemadmodum ad Glandulas Conglomeratas, ita etiam ad Disgregatas, non plura modò, ac multiplicia vasa, quantum vitalitati, nutritioni, ac secretioni est necessarium, distribuuntur; sed eò insuper artificiò propagantur, ut statim-ac extimam tum Disgregatarum, tum arctè Conglomeratarum superficiem attingunt, in multiplices primum ramulos dividantur, indeque admirabili quodam modo implicita, & sibi millies occurrentia, velut reticulatum opus constituent, innumeras maculas & mille continens retia, quò debitis ad munii exigentiam circulationis motibûs fluat, æquâ partitum portionibûs in singulas glandulas distribuitur sanguineum liquidum, nec-non conservetur & promoveatur solutio generalis liquidorum, & separatio liquidi a liquido in Glandulis absque Fermento, maximè verò ut liquoris secretionem, & deri-

Reticularis vasorum structura ad Glandulas

Laur. Bellini Opusc. de Ferment. & Glând. Prop. XXXVI.



vationem tum intrinsecâ, tum extrinsecâ compressione sollicitent.

Qua ratione præfer-  
tim ad Dis-  
gregatas.

In Conglomeratis reticulares texturæ glandulosum viscus altè subeunt excurruntque, rimulas omnes penetrando, intimèque subdivisiones Visceris omnes amplexando: Quum ad Disgregatas reticulariter quidem implicentur, sed in planum extensæ & membranulis colligatæ veluti propriam sibi tunicam adsciscant, vasculosamque provinciam, ita dixerim, efforment. Idem inquam est artificium in Disgregatarum, ac in Conglomeratarum textibus vasculosis, licèt dispositio planè diversa, quâ glandularum suarum dispositioni concinnatur: ut ubi sibi invicem super-aggestæ agglomerantur Glandulæ, multiplices quoque super-impositi invicem agglomerentur reticuli; ubi discontinuatæ in eodem plano locantur Glandulæ, in planum ipsi quoque extendantur vasculares reticuli; Quorum usus & emolumenta quoad Glandulas tum Disgregatas, tum Conglomeratas, in utroque utriusque gene-

ris

ris Urethræ Glandularum Capite inferiorius velut præfente exemplo, longè aptiorî locô, meliùsque ad captum exponere saltem incipiam.

Neque hîc adducam necessitatem Musculi supra Glandulam vigentis, quod præstabo inferiorius <sup>a</sup>; vel compendium *Cap. IV.* planè Musculosi plano Glanduloso in Canalibus & Cavitatibus super-extensi, quod præstitum supra. *Pag. 20.*





## CAPUT II.

*De Glandulis Disgregatis  
Urethræ.*

Disgrega-  
tarum ad  
Urethram  
necessitas.

**Q**Uæ in partibus supra, cursimque recensitis, ad Urethram quoque incubuit humectationis, lubricationis, & munimenti necessitas. Nimirum Urethræ interior tunica, utpote admodum tenuis, quum vasculis sanguineis non modò suis irrigetur multis, sed èt plurimis tunicam Urethræ mediam contextentibus ambiatur, ex quibus calore assidue, atque in tentigine potissimum affatim perspirante, siccitate rigere, scabrescere, corrugari, angustarique facilimè ad plura incommoda posset: Quorum alterum facile eventurum puta, quòd quemadmodum vola manus exsiccata molestè extenditur, atque plicatur, & contrectationes molestè exercet, sic Urethræ interior tunica exsiccata molestè elongaretur atque contraheretur rigentibus villis, & præterfluum excernendorum incur-

incursum duriter exciperet; quare ut  
vola manus non modò facilè movetur,  
sed èt voluptuosè agitatur, liquore a  
Glandulis miliaribus erumpente emol-  
lita, sic mollis liquore suo Urethra mo-  
tibus exteriùs adjacentium facilè ob-  
temperat, intrò-fluentium non modò  
sine molestia, sed etiam cum oblecta-  
mento agitari est apta.

Ad con-  
tractilita-  
tem, & di-  
tractilita-  
tem cana-  
lis.

Quoniam rursum quæ fluere per  
Urethram debent duplicis potissimùm  
generis liquida, urinosum, atque se-  
mineum, eorumque præcipuè alterum,  
ut celerius fluant necesse est: hinc non  
fluore solùm aliquo humectata ab as-  
peritate caveri Urethra, sed etiam ad  
minuendas occursum resistentias un-  
guinoso humore debuit lævigari, ad  
excernendorum facilitatem, seminis-  
que potissimùm, quod per lubricum  
Urethræ missile velociùs exiliat, fæ-  
cundationis, & voluptuosæ affectionis  
necessitas exigebat.

Ad facili-  
tatem ex-  
cernendo-  
rum.

Denique quoniam liquida per Ure-  
thram fluentia stimulo quòque suo ac  
impetu sunt prædita, præcipuè quæ  
E fre,

Ad muni-  
mentum  
ab acrimo-  
nia.



frequentius canalem istum excurrit, urina; acrius vexari, uri, excoriari-que Urethra posset: nisi viscidò tanquam vernice illita fuisset ac loricata.

l. 2. de sem.  
Cap. 6.

Uliginosum, istud quo Urethra humectatur, inungitur, atque munitur, omnes agnoverunt Anatomici; Ejusque duplicem ex assignatis necessitatem agnovit Galenus: Nam si totum spatium, Fauces, & Gulam, si item universa Intestina Glandulæ irrigant, quid mirum esse debet, quòd collo etiam Vesicæ tale quoddam subsidium præparatum fuerit, ne exsiccatum ad motiones torpidum redderetur? Peni verò marium multò etiam magis fuisse a Natura hoc adjunctum remedium credendum est. Hic enim in maribus magnitudine etiam conspicuæ Glandulæ sunt: quippe quum periculum esset, ne, quum prælongus his ac nudus Penis extet, exsiccatus vel distorqueretur, vel meatu occluso conniveret. Et infra: Quamquam potest fortasse Natura, ut urinae morsioni occurreret, talem humorem ad Colis meatum lævigandum præparasse. Ac vaticinanti similis: Fortasse

tasse etiam, si quis diligentius specularetur, tertiam aliquam causam inveniret. Immo plures ob hujusce humoris oleosi defectum difficultatibus in utraque per Urethram excretionem vexatos observat Jo: Riolanus <sup>a</sup>.

<sup>a</sup> Encyfr.  
Anat. par-  
ticol. lib. 2.  
c. 36.

Quo autem fonte prodeat hoc liquorem nundum certò constat. Ab Astitibus glandosis petebat citatò loco Galenus, & cum Galeno Th. Bartholinus <sup>b</sup>, Petr. Dionis <sup>c</sup>. Eandem certè sententiam, sed aliquatenus, diversòque modò discrepantem partim sequuti, partim commenti sunt Andr. Laurentius <sup>d</sup>, Jo: Riolanus <sup>e</sup>, Anton. Everardus, Th. Vvartbonus <sup>f</sup>. A Vesiculis seminariis Nath. Highmorus, ut refert Diemerbroeckius, qui in eadem sententia malè Galenum citat, meliùs de Riolo dubitasset.

<sup>b</sup> Anat. l. i.  
c. 23.  
<sup>c</sup> Anat. demonstr. iv.  
<sup>d</sup> Hist. Anat. de Car. musc. l. v. quest. xi. &  
De Part. gener. dic. l. vii. c. vi.  
<sup>e</sup> Cap. supra-cit.  
<sup>f</sup> lib. De Gland. c. 31

At verò Isbr. De Diemerbroeck ab ipsa-met Urethræ substantia derivat his verbis: *Et lubricitatem Urethræ non ab aliquo oleaginoso humore e dictis vesiculis effluente, sed aliunde oriri, scilicet ex nutrimenti Urethræ aliqua parte mu-*

Anat. l. i.  
cap. xxi.



*cida, qua interior illa via oblinitur, sicut etiam lubricitas Vesicæ urinariæ, Intestinis, aliisque variis partibus hac de causa contingit.*

Liquidum  
Utethram  
inungens  
non a Vesiculis Seminariis.

Non puto esse cur sententiam liquidum Urethram mulcens a Vesiculis seminariis deducentem longiùs impugnemus; quum satis omnibus constet in Animalium multis seminales vesículas vel deesse naturâ, vel exsuccas adesse castratione : nihilo tamen minùs in his æquè ac in aliis Urethram humore deliniri; Ut semineo liquore maderet Urethra, continuum ejusdem in illam defluxum necessarium fore : quum tamen omnes pueritia, aliquos castimonia, multos temperantia, animalia omnia structuræ (ab apposita præcipuè Caruncula) seu velis Naturæ necessitas, vel diu, vel semper, vel aliquandiu a seminis effluxione coerceat; humorem quo Urethra lenitur ab illo vesicularum multùm differre; prodigam nimis fore Naturam, quæ tam pretioso liquore, ad necessariam Venerem defuturo, nimis abuteretur

retur ad linimentum Urethræ, velut qui balsama pretiosissima ad inungendum profunderet, ut illi quondam elumbatæ magis mollitiei homines, & voluptuosorum proceres balsamis ex ultima Arabia deportatis caput totumque corpus inungebant, ut prodigialiter prodigi ad plenum luxuriæ parentarentur.

Quoad succum verò Prostatarum patet illas alto in recessu conditas, ab Urethræ extremo nimirum distitas fore, neque ab illis suppeditatum liquidum per totam æqualiter, & perfectè Urethram perducì, eamque obducere commodè posse, qualiter usum mox enarratorum solemnis in Naturæ operationibus perfectio exigebat, ut liquet ex superius<sup>a</sup> adductis incommodis in canali aut cavitate per liquidum ex uno fonte, nec per totam canalis aut cavitatis internam superficiem multiplicato erumpens obliniendâ. Denique ductuum Prostatarum orificia exiguis quibusdam carunculis obturari omnes consentiunt Anatomici, quibûs certè

Non a Prostatis.

<sup>a</sup> Cap. I.

ne



ne continuus sit liquoris Prostatarum effluxus satis cavetur, nec nisi superaddita vi Prostatas constringente, superabitur papillarum resistentia, exitusque permittetur.

Non ab Urethre Substantia.

Neque ab ipsa Urethræ substantia; cum secretiones omnes moliri per Glandulas Natura consueverit, & nihil alioquin peculiaris texturæ habeat Urethræ interior substantia, quo facere ad secretionem possit. Fortè idem *Diemerbroeckio* quoad rem præsentem dici posset, quod *Glissonio* <sup>a</sup>, mucum intestinale ab intestinalis tunicæ parenchymate deducendi, Jo: Jac. *Harderus*: nempe quòd si nomine substantiæ seu parenchymatis interioris tunicæ Glandulas quoque intelligat, sententiam non rejecerim.

a De Gula Uentric. & Intest.

Epist. ad Peyer.

De Vir. org. gener. in serv.

Nullus verò rem melius odoratus est, quàm ad miraculum usque sagax, & industrius genitalium disector Regn. *De Graaf*: Tertia opinio eorum, qui in corpore glandoso humorem gigni, vel excerni arbitrantur, ea-tenus quidem non errant; sed dum illum primariò ad oblinendas,

das, & humectandas vias urinarias factum volunt, nostro judicio erroris sunt arguendi; cum ad hoc non requireretur tantus apparatus, utpote cum innumerabiles viæ, quæ per totum Urethræ ductum, præsertim in Vitulis aliisque animalibus grandioribus, conspiciuntur, ad humectandam Urethram satis multum liquoris possint adferre.

Et quidem postquam Glandulas Urethræ Disgregatas detexi, cum in hunc *Graaffii* locum inciderem gestiebam summopere tenues labores meos indefesso Genitalium Scrutatori jam pridem placuisse. Antequam verò Illas detexissem ( meam vel in legendo incuriam, vel ad intelligendum hebetudinem fateri ingenuè lubet ) quamquam sæpe meis versaretur manibus *Graaffius*, nunquam in citato textu moratus fueram, aut quidquam affulsit mihi, quo rem istam agnoscerem, sed neque ut tentarem. Atqui eâdem ( quâ ego ) incuriâ culpandi essent quotquot de Urethra post *Graaffium* scripsere Anatomici undequaue exactissimi, nisi meam

Non ab incertis *Graaffii* viis nisi sint non

an-



antehac , auctorumque inobservantiam excusaret ipsa *Graassiani* textus manca , & obscura expositio , quæ quid sint hæ innumerabiles viæ , aut unde prodeant , an glandularum excretoria sint , vel meri membranæ pori , & an in homine , quove modo se habeant , minimè certò declarat , ut rem seriò tractanti opus fuisset ; ut clarè constet id imperfectum adeò & ancepsa *Graaffio* , ut ferè intactum videatur . Hæc sane ex illorum sunt genere , quæ postquam curiosa cadaverum sectione didicimus , in Authoribus agnoscimus , quorum lectione contentos semper latuissent velut sepulta , aut nundum huc-usque comperta . Quidquid sit tantum abest ut susceptam provinciam velut alienam deponendam , quin potiùs ineundam alacriùs censeam ; eo-met ipso quòd *Graaffius* tametsi lucem mihi non attulerit , saltem eximium nunc addat instituto nostro robur & firmitamentum .

Profectò licèt de Glandulosa Intestinorum structura jam ante scripsisset  
Fr anc.

Franc. Glissonius a, Oliger. Jacobæus b, 3 Lib. de  
Jo: Svanmerdam c, Marcell. Malpi- Gul. Ventr.  
ghius d, & Casp. Bartholinus e in extis b Ad. Med.  
leporinis; nihilo tamen minùs Accu- Tb. Bartho-  
ratissimus Peyerus Jure omni, & uni- lini Vol. 3.  
versali plausu Glandularum Intestina- Obs. 64.  
lium inventor cluet. Neque hoc affe- c Figur. 2 Tb.  
ctando Inventoris nomini dictum pu- Bartholino  
tes, quippe hóc animo dissimulare cõmunicat 2  
Graaffii locum facilè potuissem, sed d Epist. ad  
agere candidiùs volui, æquiùs aliorum Jac. Ruffi.  
candori judicium relicturus. e Ad. Med.  
Hafn. Vol.  
1. Obs. 136.

Adjungeret fortè hìc quispiam Hie- In Dissert.  
ronymum Barbatum, velut qui agno- Anat. de  
verit albescentes ductus ad Glandem us- Format. Or-  
que sub Urethræ tunicam expansos. At ganiz., &  
verò ab Ejusdem textu patet quàm Concep. &c.  
longè a re nostra, & veritate distet  
Barbatus, qui pag. 40. quot verba tot fig-  
menta proponit, ut verbis utar Casp. Bar- Epist. ad  
tholini: Prostatarum radices ( inquit Bar- Ger. Blasii.  
batus ) ab Arteriis nascuntur per corpus  
Penis expansis, unctuosam non extrava-  
sati sanguinis humiditatem intra Prostata-  
tarum cavitatem adducentes, quæ mus-  
culorum super-impositorum compressione in



alios pellitur albescentes ductus ad Glandem usque sub Urethræ tunicam expansos, rotundasque Penis dein innumerabiles ingreditur fibras, ubi calore arteriarum fit tenuior, sicque venereis imaginationibus, cognitionibus, aut delectabili contactu accendatur sanguis, extenuatur magis fibrillarum humor, ac vertitur in flatus, quibus erigitur, tenditurque Colis &c. unde patet non modò quàm fictitius ineptusque, sed etiam quàm alienus a Re nostra *Barbatus* siet; utpote qui ( quantum conjecturâ assequor ) pro canalibus Prostatarum assumpserit albos illos tractus, quibûs interna Urethræ facies picturatur.

Prostatis  
supplemē-  
to additæ.

Disgre-  
gata.

Quoniam igitur istud Urethræ lining-  
mentum, vel nullum, vel sanè insuf-  
ficiens dari a Prostatis potest: earum  
itaque vel supplementi, vel adjumen-  
ti loco, Glandulas alias extruere opus  
Naturæ fuit, nostrum inquirere; ean-  
dem rationem & modum illa adhi-  
bens, nos comperientes, ac Pancrea-  
ti Peyerianæ, Conglomeratis salivali-  
bus ad Labia, Palatum & Fauces, mi-

nores Disgregatæque aliæ fuerunt super-addendæ, tanquam affecclæ, aut saltem affines. Quàmque affines sint cum Prostatis Disgregatæ nostræ, patet in Brutis illis, quorum Penis est magis nervosus & tendinis in morem rigidior ut Bovi, Cervo, Capro, aut Hirco, Ariete, aut Vervece, Porco &c. Prostata non in unum corpus glandosum coadunantur; sed pluribus singulatim distributis, seriatimque dispositis Glandulis ad normam illarum, quas Urethræ Disgregatas apello, simplicius efformantur.

Porro Brutis hujusce generis, utcumque grandioribus ( quidquid dicat <sup>i. pag. mea.</sup> citatus <sup>39.</sup> supra Graaffius ) Disgregatæ nostræ non adeò conspicuæ pro longitudine Urethræ apparent. Quin ipsæ etiam in Urethra Equina, ubi spectabiles maximè Glandulas mihi promittebam, mirabar exiguas adeò, ut primò vix, indè tantùm, dari possem asserere: Fortè quòd minùs aptæ ad hanc observationem nobis occurrerint Urethræ; sed fortè etiam quòd hisce ani-

Disgregatæ in Brutorum Urethra.



malibus, utpote Herbivoris, minùs sit acris urina, nec-non aliquantulum glutinosa, in Equino potissimùm genere, cui idèd ad Penis & Urethræ proportionem minores sunt, quàm in reliquis animalibus supra notatis: in Porco autem contraria de ratione magis, quàm in reliquis ex hoc genere animalibus, manifestæ. At verò quibus Penis est osseus, ut Cani, Vulpi, Lupo, Urso, Leoni & consimilibus, cum animalia sint Carnivora, salibus ab alimento eliquatis onustam magis acrioremque urinam emittentia, conspicuæ aliquantulum magis, quàm in supra-citatis Glandulæ se se produnt. Nulli verò magis quàm Homini insignes adsunt, quam ejusdem, ut Vini-potoris, magis quàm reliquorum animalium, urina armoniaco sale præpolleat, sola donetur Philosophico, *Jung-Kenii* sententiâ, magisque adurenti stimulo acuatur, majoremque faciat munimenti necessitatem. Hinc Muliebri quidem Urethræ ad proportionem brevitatis suæ satis patentes occurrunt du-

ctuli

In Humana.

*Med. præf.*

*sec. acco-*

*mod. part. 3.*

In Muliebri.

Etuli a subjecto glandulari corpore producti, non illi modò, quos in principio Urethræ, & in inferiori antica Vaginæ parte observat, in inferiori parte, prope Meatus urinarii exitum collocat, & Lacunas appellat Graaf, quos De Mulier. Org. gen. in-serv. De Meat urin. que solummodo describunt vulgò Anatomici; sed alii insuper, exigui licèt, in ipso-met urinario meatu satis aperti. Virilis autem Urethra, utpote longior, & officio, præter urinæ excretionem, digniori speciatim dicata, canalium & Glandularum segete lætiori ditatur, nostramque idè tractationem istam ad se præcipuè convertit.

Etenim-verò si longa sectione, per longitudinem quam velis, Urethram In Virili. aperias, totam primò faciem ejusdem internam viscido fluore uliginosam, lubricamque statim observas: plurimis Descriptio. ac tenuissimis canaliculis huc illucque micantibus totam penè scaturiginosam nullo labore conspectas; detractâque interiori tunicâ nerveâ, eidem subjecti, corporique urethræ spongioso altius insculpti emergunt orbiculi sub-



subrotundi ; unde vascula excretoria prædicti prodeunt canaliculi liquorem seroso-viscidum tenui gutture funditantes.

Varietas  
in multi-  
tudine.

Atqui quod in Anatomicis occurrit solemniter, non in Urethris omnibus æqualem tubulorum & glandularum magnitudinem, numerumque comperies : In aliquibus plures occurrent, in aliis pauciores ; semper tamen satis, aptèque ad necessitates suas : In aliquibus pauciores sunt sed majores, in aliis minores, sed proportionaliter multiplicantur ; ut nusquam iniquam agnoscas omnium Parentem & Arbitram, quæ suarum studiosa partium ubi in multitudine defuit, magnitudine adauctâ compensat, profusorem verò multitudinis alicubi munificentiam, debitâ magnitudinis detractiōe contemperat.

In magni-  
tudine.

Quin velut exsecto Pancreate in Canibus tum Glandulæ, tum liquoris pancreatici defectum solito copiosiori lymphæ a glandulis intestinalibus, tum magis tumentibus, affusione ordinariò com-

compensari observat *Brunnerus*, sic nunquam magis conspicuæ fiunt, succumque copiosius, ultroque Urethræ sup-  
*Experim. nov. circa Pancr.*  
peditant Glandulæ Disgregatæ, quàm ubi exiguas admodum esse ad Urethræ basim Conglomeratas contingit.

Neque æqualis semper aut similis In Liquore omnino est in Urethris omnibus ab hisce Glandulis liquor : quandoque enim illa est uliginis hujusce copia, ut cænosa velut ac lutulenta videatur Urethra. Licet etiam seroso-viscidiusculum sit & albescens liquidum, sæpè tamen, quoad consistentiam, mox diffluxile magis ad serosum, mox hærens magis ad mucilagineum; quoad colorem, mox ad diaphanum, mox ad pallidum, mox ad subluteolum, magis accedit, & multiplices varietates assumit, prout est liquorum, a quibus secedit, & glandularum, atque canalium, per quos secernitur, ac fluit, major, aut minor a naturali inmutatio.

Orbiculorum vel ( ut organa secretioni destinata appellare consuevimus ) Glandularum Habitudinem, saltem plerarumque magni-



gnitudo exigua adeò, ut ægrè conspicuæ fiant : substantia mollis & facile concidens, ut si paululum contrectentur exinanitæ collabantur, ac ferè dispareant : figura ad orbicularem multum accedens ; copiosiori namque liquore turgidæ quandoque in subrotundum tument, succi autem copia quandoque minori in lenticularem jacent.

Structura.

Structurâ vesiculares utriculo constant membranoso tenui, cavitatulâ prædito, qui se se angustando guttulum suum efformat, & sensim exilesceat meatum producit, ac per nervosam Urethræ tunicam transversum agit, figurâ conicum, cujus latæ basis loco ipsa est glandula, apex in Urethræ cavitationem hiatus.

Vid. Fig. I.  
lit. ooo.

Plerique discriminati invicem glandulosi folliculi suum sibi canaliculum singilatim efformant, aliàs verò aliquot unâ colligantur, canalesque magis conspicuos emittunt, ordinariò duorum numero vel trium, sed rariùs in Urethræ Cavernulam aut prope saltem hiscentes.

Quo

Quo autem modo hæc glandularum collectio fiat, nempe an per multiplices glandulas ad mutuum contactum in eodem plano coadunatas, & velut in legionem congregatas, singulas suis præditas excretoriis singularibus in cavum aliquod aut utrinque apertum, aut cæcale hiantibus, quem-ad-modum tenuivium intestinorum Racemosæ, aut ad Cæcum glandulæ confertissimæ; an verò per glandulas plures velut in racemum collectæ, aliæque aliis superstratæ, & in idem excretorium patentes veluti quæ verè apellantur Conglomeratæ: propter rei exiguitatem nihil certi deprehendere potui, propter debitum scribenti candorem, nihil auderem asserere. Si tamen datur sententiæ meæ locus coadunatæ potiùs esse quàm verè conglomeratæ videntur. Profectò si mei me oculi non fallunt penitus, non unus ad grandioris canalis extremum grandior folliculus, aut granulorum glandularium massa, sed ejusdem fundus pluribus insculptus utriculis apparet manifestò.

Compositio Disgregatarum majorum.



*Supra-cit.  
lib. II. de  
sem. cap.  
VI.*

*Dissert. VI.  
p. 181.*

Postquam *Galenus* a necessitate glandularum ad Intestina necessitatem Prostatarum ad Urethram deduxit : Postquam *Jo: Fantonus* ( quem propter præclarum animi candorem non minùs, quàm plus-quam singularem in rebus anatomicis & medicis eruditionem, non ingenuo minùs amore, quàm debitâ observantiâ amicum prosequor ) in *Dissertationibus Anatomicis* quas tanta cum sui gloria, tanta cum Orbis utilitate Publico nuper concessit : postquam ( inquam ) Egregius Vir analogiam instituit inter canalem intestinalem, & urethram, inter glandulas potissimum lenticulares intestinales, & glandulas prostatas : & quem intestinales in intestinis, prostatas in urethra usum præstare sapientissimè censuit : liceat mihi lumine a *Galeno*, exemplo a *Fantono* excepto, eandem comparisonem prosequi atque provehere, & majori similitudine analogiam confirmare, atque etiam augere.

Inter utramque igitur fistularum quæ egerendis potissimum excrementis dicantur, nimirum inter canalem ( sic  
apel.

*De Gland. Disgr. Ureth.* 51

apellare liceat / fæcalem, & urinarium analogiam instituo, inter glandulas Intestinorum lenticulares, & Disgregatas Urethræ. Persimilis quippe omnino utra-  
rumque, dispari licet mole, structura, figura, & consistentia; quibûs sanè qualitatibûs non Racemosis minùs quam Lenticularibus Intestinorum sunt comparandæ: quum nulla sit Racemosas inter & Lenticulares quo-ad structuram usumve diversitas, sed in hoc uno tota, quòd ( uti in Gallinaceorum Bulbo ventriculi *Peyeriano* molendinaris machina ) sic illas in tenuibus intestinis aliqua peculiaris utilitas instar manipulorum congeffit, quas libera & simplex Intestina oblinientis, contentaque modificantis liquidi suppeditandi necessitas, velut in Crassis, sic in reliquis nullo vetante aptissimè disgre-gasset.

Quod utilissimum in crassis intestinis, etiam in Urethra fuit, ut non civiles seu in aggeriem collectæ, sed inciviles sive segregatæ invicem fuerint glandulæ, ne alicubi justo magis cu-

Glandulæ  
Urethrales  
Intestina-  
libus Ana-  
logæ.

Utrobique  
Segregatæ.



mulatis, alibi longiorique ad-modum tractui denegatis, inæqualiter nimium humectaretur Urethra, majorique illic excessu, illic defectu liquidi, ubique detrimentum proveniret: quum e contra singilatim dispositis, sejunctisque ad brevissima intervalla laticibus riguo debita proportionem distributo tota gaudeat Urethra.

Inordinata.

Quod ut promptis quaquaversum emissionibus feliciter contingeret, non disgregatim modò, sed & temere velut sparsa & vaga meatuum turba disponitur: neque enim ullum in situ suo ordinem exactè servant; nisi regulæ cujusdam loco habeas, quòd seriatim ferè, & parallelè disponantur, tum inter se invicem, tum ad albam lineolam, quâ Urethræ concavitas per mediam longitudinem dirimitur: quod tamen rigore sumendum non est, cum aliqui ab instituta serie exorbitent passim tum in ipsa-met linea, vel propius ad ipsam, vel remotius assurgentes. Quæ sanè temeraria velut dispositio quanti sit consilii, patet ex plur-

ribus in omni Disgregatarum genere hujus positionis exemplis, quanti verò emolumenti, ex iis quæ de Glandulis Disgregatis in genere diximus supra.

Ad quos  
usus.

Nempe quo tectorum, persimili animalium machinatrix scientia usa videtur artificio: velut illa lateres non in directam perpendiculariter seriem super-ponit, seu non ita ut later lateri quoad ambitum congruat, sed ita alternè ut perpendicularis linea contactûs duorum Laterum bifariam secet laterem succedentem, cujus longitudo super-ponatur duplici subjectorum Laterum semi-longitudini; ita hæc tum in locis plerisque, tum maxime in Intestinis & Urethrâ glandulas, earumque canales non in rectas series inter se parallelas, sed alternè disposuit ita ut spatio inter duas glandulas vacuo correspondeat, sive super-locetur glandula: Et velut Illa expositâ dispositione ligatis invicem Lateribus validissimæ resistantiæ moles diuturnas solidat, quas per series perpendiculares, & mutuò parallelas invicemque disjun-

Exemplū  
a murariis.

ctas



Etas extruxisset evanidas, raras, brevique casuras; sic Ista spatiis intra glandulas alterno ordine occupatis totam debite, ut plurima etiam cava, implet Urethram, & unicuique ejusdem parti glandulam & canalem adaptat suum. Quod si glandulæ in series sibi invicem parallelas fuissent dispositæ & plures eformari glandulas, aut series sibi invicem proximiores instrui opus fuisset Urethrâ non æquabili aliter irroratione ditandâ.

Et inequales.

Ad Canalis Principium vel nullæ.

Quæ itaque inordinatæ & velut disjectæ per incuriam primâ fronte videbantur, glandulæ non tales verè sunt, sed alternè maximâque curâ dispositæ, aptâ etiam ad hoc diversitate magnitudinis, quâ tum glandulæ tum canales inæquales occurrunt, hique tum diametro tum longitudine, atque aliqui exigui adeò sunt & breves, ut parvulô unicè se se prodant ostiolô.

Consimili quoque ratione ut locis suis proportionalis sit, inæqualis est canaliculorum distributio. Et quidem velut *Duodeno ac Jejuno Pancreas fer-*

*men.*

menti affatim subministrat, ut plures ibi glandulas non requiri putet Peyerus; ita & institutæ analogiæ, & Disgregatarum Urethræ Glandularum usibus minime dissentaneum videbitur quod aliquis a Prostatis urinarii canalis tractus propositis glandulis vacuus sit & inmutis.

Epist. IV.  
ad Murat-  
rum.

vel pauca.

Primò itaque paulo supra Urethræ medium, ibi loci ubi primùm illa emicat a Perinæo, duo primùm Canales majores emergunt, quos unà cum glandulissuis Conglomeratis descripturi sumus inferiùs. Hic primò ex Disgregatarum ductibus solitarium aliquem observabis in ipsa-met area, vel peninsula, quam exarandi mox ductus majores eformant, intercipiuntque: postmodum verò emergere ductus incipiunt prope Eorum exitum.

Infra can-  
nales Con-  
glomerata-  
rum præ-  
cipuè ad-  
sunt

Cap. III.

Quoniam autem infra exarandi Conglomeratarum Canales sufficientem liquoris copiam effundunt; hinc prope eosdem, non multos extrui ductus necessarium fuit: quod verò aliquantulum receditur copiosiores: quare non ma-

Majori il-  
lic necessi-  
tati.



gna circa Canalia Majusculorum exitum meatuum copia, major circa Urethræ medium, plusque adhuc quò magis ad Urethræ extremum acceditur.

Ut in Crassifis Intestinis sic ad Urethræ cavernulâ majores.

Velut in crassis intestinis ab excrementorum duritie ac asperitate molestæ confricationis ac etiam lacerationis periculum in nervea tunica, affixæ in eorum ductu glandulæ succum glutinosum copiosius suppeditantes providè impediunt præcaventque, sic etiam glandulis numerosius sobolescentibus ditatur, inungiturque copiosius ad Cavernulam Urethra, ubi acrior aliquantulum urina, semineum aut putridum quidpiam hæreere, acriterque exurere facilius potest.

Exerc. 2.  
De Gland.  
Intest.

Ut ad Podicem Succenturiatæ Peyerii, sic ad Glandis

Atqui velut glandulis intestinorum aliæ ad podicem succenturiantur, quales *marsupiorum exilium specie apud Josephum Duvernay in Hyæna odorifera*, indeque in homine similes *Graaffianis Lacunas* observavit Conrad. Peyerus: ita ad extremum Urethræ, ipsumque Glandis osculum, & quæ osculi labella inferius committuntur, & Frænuli ligulâ colli-

colligantur, e vix sensili, longô tamen  
tubulô ostiolum curiosè aperitur, suum  
eructulans liquidum; quod ni factum  
Glandis osculum utpote aeri magis expo-  
situm, faciliùs exsiccatum corrugaret ur,  
ac conniveret, aut exquisitissimi utpote  
sensûs ustulatum sæpius indolesceret.

Osculum  
majorum  
Glandula-  
rû aut du-  
duû unus  
aut alter.

Ut autem & Glandulæ, & quæcum-  
que huc-usque exposuimus meliùs pa-  
teant, placeat Tibi interiori tunicâ Ure-  
thram deglubere. Nerveam internam  
membranam duas in lamellas facilimè  
divides; quarum prima tenuissima est, se-  
cunda verò consistentior. Huic affixæ  
sunt glandulæ; ita tamen ut supra posti-  
cam hujus tunicæ faciem versùs subje-  
ctam nerveæ tunicam, aut supparem tu-  
nicæ, spongiosam substantiam extube-  
rent, & tunicæ nervosæ velut appensæ  
spongiosâ excipiantur, eique innixæ re-  
ticulari contexturâ firmentur. Namque  
cum Corpus Urethræ spongiosum mul-  
tiplici vasorum in omnem peripheriam  
flexuosè propagatorum congerie con-  
stans vasculosis ubique cancellis reticula-  
tum sit & sinuatum; inter reticuli pla-

In secunda  
interioris  
tunicæ la-  
mella lo-  
cantur.



Et exci- gas seu maculas Glandulæ nidulantur,  
 piuntur scrobiculos foveolasque nactæ, velut ad  
 spungiosâ formam & habitum suum exculptas;  
 substantiâ. nec-non vasculis plagæ lateralibus illa-  
 rum parietes proserpentibus perbellè  
 suspenduntur, pulchrèque irrigantur.

Liquet igitur respectu Glandularum  
 suarum spongiosam Urethræ substan-  
 tiam tunicæ vasculari, quæ canalium  
 & cavitatum glandulosarum tunicæ  
 glandulosæ super-incumbit, comparari  
 aptissimè posse.

At verò e multiplici vasorum strue  
 velut e multis laminis vasculosis extru-  
 ctum Corpus Urethræ spongiosum ut  
 structurâ & mole reliquas in humano  
 corpore tunicas vasculosas exsuperat,  
 ita quod officii in illis exposuimus su-  
 pra e, aptius præstat.

e Cap. I. p.  
 29., & 30.

Potentia  
 Glandulas  
 premunt.

Externa  
 Urethræ  
 tunica.

Quem-admodum ad OEsophagum,  
 Ventriculum & Intestina, tunicæ glan-  
 dulosæ cavus eorum musculus circum-  
 ducitur, aut in partibus reliquis glan-  
 dularum plano carneæ fibræ super-ex-  
 tenduntur, talis ad Urethram est exter-  
 na ejusdem tunica, internâ crassior, &

villis orbicularibus texta, quorum contractione, constrictâ Urethrâ, contenta ac præter-labentia commodius expelli omnes consentiunt Anatomici.

Neque excludenda omninò tenuis illa, solida tamen membrana, quæ cuncti subjecta penem totum ambit arctissimè, quam tum Antiqui, tum Neoterici, paucis exceptis, Anatomici Panniculum Carnosum, *Riolanus* Carnosi Panniculi productionem appellat. Idque ex eo potissimè velim, quòd ea ex parte, qua Urethræ super-extenditur, robustior atque fibrosa magis evadat in Viris præsertim mentulatiorebus.

Panniculum carnosum.

*Encheirid. Anat. l. 2. c. XXXII.*

Equinam Urethram semi-ambit Musculus ferè circularis satis validus, fibris constitutus ab ipso Penis corpore utrinque supra Urethram descendentes, & ad lineam Urethræ longitudini mediam sibi invicem adnexis & colligatis. Humanæ profectò Urethræ consimili musculo opus non fuit, analogâ tamen certè potentiâ, & necessitati suæ proportionatâ, licet minori. Nec modò ratione contractilis potentiæ, sed etiam ratione ar-

Velut in Equo Musculus.



etioris involucris exaratus panniculus Urethræ constrictionem procurat : quo fit ut Nervosis Corporibus Urethra continuè applicetur, ipsisque cum spongiosa Urethræ substantia turgentibus, & extrorsum urgentibus, tuncque ipsorum distractioni contra-nitente Panniculo, Urethra magis angustetur.

*Biblioth.  
Anat.*

Et Corpora etiam nervosa.

Corpora quin etiam nervosa peculiaris structuræ musculum constituentia ex *Malpighii* ad *Mangetum* Epistolis, musculi quòque officium supra Urethram præstant vnà cum Glande, ut Urethram & Glandulas comprimant, præcipuè quæ ad Urethræ fornicem sunt insculptæ, ipsique Corpori immediatè subjectæ. Hinc puto est quòd paulò magis consistentes tum Glandulæ tum exterior Urethræ tunica ad Urethræ dorsum videtur qua longitudine Corpori Nervoso subjicitur.

Liquoris secretio in Glandulis.

Vascula igitur plurima a spongioso Urethræ corpore communicata glandulas perreptant irrigantque, atque a membranoso Folliculi cujusque pariete in cavitatula lenem humorem guttilu-

lulant, qui inibi velut in conceptaculo cogitur, ac detinetur, quò molles facilèque distractiles Glandulæ momentulo turgescant in reticulorum macularumque gurgustiolis ab aliquanta distractione nequaquam coercitæ, vel impeditæ; identidem verò nitentibus passim in distractionem, aut turgentibus vasculis, glandulares folliculi arctius ambiuntur, passimque torcularis in morem coarctantur, utpote levi cuilibet compressioni facilè cedentes, & obsequentes prementi.

Reticulûs ergo vascularibûs Glandulas comprehendentibûs alterno systolis & diastolis motu agitantibûs, villis autem Urethræ applicitis assiduè in contractionem nitentibûs ac oscillantibûs, aliquid semper liquidi in Urethræ cavitationem emulgebitur, ut mulcentibûs rivulûs rara veluti psecade, ac mollî substillô Urethra passim ac ferè indefinenter suavi temperamento leniùsque adluatur, leviculo ictui cedentibûs canaliculorum saltem plerorumque brevitate, quoad magnitudinem, ac consi-

Excretio  
fit a vasis.

Facilitatur a tenuitate Glandularum & Canaliculorum.

sten.



Eorumq;  
brevitate  
& directio-  
ne.

stentiam tenuitate, nec-non etiam positione illa, qua ita supra Urethræ longitudinem plerique jacent, ut eandem habeant cum Urethra directionem: nempe quòd anteriùs, id-est versùs Glan- dem prospectent, Urethrâ in laxitatis, ac ordinario statu, deorsum vergente ac inclinatâ, facilem habeat liquor iste in, ac per Urethram defluxum. Quod autem pauculi aliquot Urethræ alveo adversi notentur tubuli, id universim non officit, cum maximè difficultas ascensus a brevitate compensetur facilimè superabili. Quin etiam opposita Urethræ directioni pauculorum horumce tubulorum positio præcipuùm facere ad oppositum quandoque statum Urethræ, cumque liquoris maximè indigum, conjectari possemus.

Remora-  
tur ab eo-  
rum tenui-  
tate, co-  
nicâ figu-  
râ, obliqua  
positione.

Ut verò ad majora, ut opus erat identidem, dispendia tantulùm cumu- laretur, frænari, ac morulîs cohiberi liquoris hujusmodi fluxus debuit, id- que præter canaliculorum tenuitatem, conicam figuram, & obliquam positionem, aliqua eorundem tortuositas præ-

præstat, mollique proserpere flexu lymphulam cogit. Inclinati quippe per longitudinem Urethræ, interiorique ejusdem tunicæ exculpti canaliculi & Urethræ & nerveæ tunicæ varietatibus non obsequi nequeunt, sicque non directi semper, sed concidente laxâque in ordinario statu Urethrâ, laxi flexuosique sunt etiam in ordinario statu canaliculi, non incommoda sanè ad fluxum difficultate.

Ast ubi major hujusce liquidi influxus intrâ seminis, urinæque excretionem exigitur; quæ hujus liquoris copiam exigunt, ipsæ faciunt utræque per Urethram excretiones: namque decurrente supra compressiles facilè tubulos urinâ vel semine, Glandularum fluor facilè & copiosius exprimitur: Eoque maximè quòd tubuli dorsò suò supra Urethræ planum leviter prominuli, & obliquè producti id præstent ut comprimens desuper liquidum validius incurrat, & in transversè objectos Canales contra nitens vires concitet majores, eorumque majori momentò liquor emexpressent.

Promove-  
tur in uri-  
næ semi-  
nisque ex-  
cretionem.

Con-



Turget in  
Venerem.

Concitato autem ad Venerem animali has quòque turgere Glandulas, & suum quòque stimulum addere minùs improbabile videretur. Sic proludente etiam quandoque Venere succensis Genitalibus, distentâque Urethrâ & a turgentibus vasis in Glandulas & a turgidulis Glandulis in Urethram per tubulos facilè patentes, tumque præsertim directos non sinè impetu quodam tacitus ille & clandestinus in motibus illis primò-primis, ac ferè sine sensu, aut sanè consensu vel animadversione diffluet humor, in his præsertim qui Veneri magis facti, aptique ut reliquorum sic horum quòque genitalium siphunculorum magnitudine numeroque ditantur.

In eâque  
copiosius  
profilit.

At verò in ipsa-met Venere quanto plus liquidi, majori cum impetu promptis quaquaversum emissionibus velut ejaculati profiliet, tanquam prolifico semini genuinoque accessorii; quo præliniato tramite, adauctaque mole semini, ejusdem & facilior & voluptuosior viris ejaculatio, mulieri receptio contingat.

## CAPUT III.

*De Glandulis Conglomeratis Urethrae.*

**U**T proximo Capiti rem Disgregatarum, sic praesenti Conglomeratarum universim claritatis, ergo praemittere & animus mihi & operae pretium erat; id tamen quum variis de causis mihi licuerit minus, sejuncti capituli locum habebis ea, in quae passim exorbitavit calamus, generalem Conglomeratarum Doctrinam quoquomodo attingentia.

Ad globulum illud spongiosum, lividum & cerasi-forme corpusculum, spongiosae, qua constat Urethra, substantiae principium, non longa infra Prostatas distantia, parvae prostant Glandulae, minoris fabae communiter magnitudine; in hac enim variant admodum: inter majores quas videre contingit, illae sunt quas in Figura exhibemus. Ponderus ad lancem exigere (ut de Glandulis suis Ant. NucK) super-  
Glandularum Urethrae Conglomeratarum.  
Situs.  
Magnitudo.  
Vide Fig. I. Lit. MM.  
Sialograph. nova.

I

Ha.



Facies ex-  
terna.

*Zootomia*  
*Tab. XII.*

Harum facies est qualis vesiculis Seminalibus Simiarum a *Gerardo Blasio* pingitur, seu melius species tota est glandularum conglomeratarum. Albidus gratusque qualis glandulis conglomeratis color; figura oblongo-rotunda, quæ tamen sub-indè variat; superficies inæqualis, velut ex acinibus plurimis composita, seu hemisphæris plurimis tuberosa.

Interna.

*Adenograph. cu-  
riosa.*

*Ep. ad Soc.  
Angl. de  
struct. glād.*

*Opusc. Prop.  
XXIX. De  
mor. Bil.*

*Propos.*

*XXXVIII*

*De Fermēt.*

*Gland.*

Interna Glandularum structura, quatenus attingi oculis potest, ex plurimis glandulosis pumicosisque acinibus videtur constitui, quos non meras esse texturas vasculares *Nuckianas*, sed folliculorum peculiari corpore membranoso constantium congeries *Malpighianas*, est perquam probabile; utcumque indè peculiare hoc corpus glandulare canaliculo cylindrico vel advoluto in spiram, vel plicato in plicas ad modum intestinuli efformetur, quemadmodum structuras secretorias exponit *Doctissimus Bellini*.

Ab Utriculi cujuslibet membranosa substantia, peculiari quadam ratione,

mo-

modificata in totidem lagunculas, seu cavitatulas extillat guttulis omni captu minoribus, & ex cellulis in canaliculos excretorios peculiare liquidum, diaphanum quidem ac limpidum, viscidum tamen ac tenax: licet non diffitear tantam in vivente animali visciditatem non adfore, cum mors humoribus lentorem inducat non suppeditis, avolantibus, fixatisve particulis volatilibus, quod in saliva huic humori congenere *NucKins* animadvertat.

*Sialograph.  
nova*

Harum itaque structura glandulis conglomeratis est omnino persimilis, uno diversa discrimine soliditatis, quæ in his Glandulis major est, quum reliqua conglomeratæ laxiores sint, & molliores: Id tamen diversam non arguit structuram, & operandi rationem; hæc enim diversitas tota pendet a majoribus vel minoribus spatiis glandulæ interceptis, adeoque a majori vel minori loculorum, ac inter-capedinum copiâ ac amplitudine. Nimirum assiduus quidem sed modicus Liquidi hu-

Velut in  
Conglo-  
meratis.

Soliditatis



Ratio.

jus in Urethram proventus esse debuerat, ut ex infra-dicendis philosophari licet; hinc minor loculorum copia ac amplitudo: quare angustiores relinquuntur areæ, & glandula minùs compressilis, minùsque friabilis efficitur.

Et diversitas.

Simplicitatis amicissima simul & necessitatis provida Natura semper sapientissima, ratione requisitæ quantitatis liquidi debitam glandularum, seu glandularium folliculorum copiam accommodavit: vel in unum vel in plurima loca confluendi causa vel in congerie congregavit, vel latius distribuit solitarias: excernendis diversæ consistentiæ lymphis, diversæ etiam consistentiæ glandulas tum Disgregatas, tum Conglomeratas adhibuit.

In diversis glandulis.

*Ep. ad Soc.*  
*Reg. Angl.*  
*De Struct.*  
*Gland.*

Humori Pericardii, Pleuræ, Tracheæ, Peritonæi, & Vaginalis Testium tunicæ tenuissimo liquori exstillando quodque tenuissimas ex observatione *Malpighii* Glandulas; Hominum & Quadrupedum Oesophago Medias, Volatilium Oesophago, reliquorumque animalium Ventriculi & Intestinorum & Na-

& Narium mucosæ, Auriumque ceru-  
mini crassiores, easque in eodem ordi-  
ne diversimodè inæquales ad propor-  
tionem diversæ consistentiæ in liquido  
suo destinavit. Liquido Pancreatico  
utpote tenuiori glandulam minùs com-  
pactam, seu potiùs friabilem; Saliva  
Pancreaticâ lymphâ aliquantillam mi-  
nùs diffuxili, hinc Salivales magis com-  
pactas; viscidiori adhuc salivæ con-  
stantiores dicavit Glandulas, Tonsi-  
las potissimùm, quæ & acinis constar-  
majoribus & naturaliter admodum  
sunt pumicosæ, ut observat Ant. Nuck, *Adeno-  
graph. curio-  
sa.*  
Articulorum ax' ungiæ glandulas, quas  
Tonsillis comparat ipsarum detector  
*Cloptone Havers*, quæ ex membranis *Osteolog. no-  
va Discus-  
su IV. De  
Gland. mu-  
cilag.*  
pluribus textæ densitatis habent & ro-  
boris plurimum, nec ita facilè admo-  
dum divelluntur. Sic etiam Prostatas  
ex valde tomentosiss efformavit utricu-  
lis, sic etiam par erat similem consi-  
stentiâ Prostatarum, liquorem effun-  
dentes Glandulas ex consistentibus ma-  
gis acinis efformari, ut viscidiusculus  
liquor spongioso magis corpore meliùs  
excerneretur.

Quod



In Vitulo,  
Sue dome-  
stico, Arie-  
te, Cervo.

Quod maximè de Glandulis istis in Vitulo, Porco, Ariete, Cervo, constat, quæ compactæ admodum sunt & ferè carnosæ substantiæ; licèt id quodque ex eo provenire censerem quòd, cum probabile sit hæc Glandulas Veneris usuturgere, Vitulis in hanc palestram nondum admissis, immo a Venere per castrationem emancipatis, probabile est, angustatis vasis, inanibus ferè loculis, retractis fibrarum fasciculis, minorem, gracilem, & duram reddi qualis observatur, Glandulæ molem.

Glandularum cana-  
les excre-  
torii in  
Homine.

Porro insensiles planè canaliculi singulorum acinorum excretorii in unum alveum concurrentes canalis excretorii principium intrà Glandulam constituunt, qui unus utrinque, alter ab altera egreditur Glandula, pellucidus & albumineo liquore turgidulus, statimque egressus versùs Urethram inclinatur, mox sub Ejusdem tunica longo aliquo tractu, trium scilicet transversorum digitorum longitudine defertur, donec paulò supra medium Urethræ, finem sortiatur, ubi leviter compres-

sus

sus ab angusto ostio visceris liquoris globulos velut chrySTALLINOS depromit.

In Brutis supra-citatis ( quibus per- In Vituli-  
similis est Genitalium structura ) ad no, & Suil-  
terminum Urethræ carnosæ ( sic apelo genere.  
lo canalem a cervice Vesicæ Urinariæ  
ad Penem productum, & musculo-  
corpore in hisce brutis obvolutum )  
insignis elevatur membranea valvula  
adinstar velæ circum-tensa, figurâ ob-  
longo-triangulari, seu mitrali, Valvulis  
Venarum persimilis, vertice ad cervi-  
cem Vesicæ, basi ad elongatam infe-  
rius Urethram spectante.

Inter duplicatas hujus valvulæ tuni-  
cas canales prædicti deferuntur, qui  
tandem ad marginem Valvulæ in me-  
dio, duplici præ-angustoque ostiolo de-  
finunt. Namque hic loci est ubi ab-  
dominis cavum linquens sursum intor-  
quetur Urethra, nervosis corporibus  
committenda; ut proinde ne in ascen-  
su suo renitens retro-laberetur lotium,  
apponi valvulam necesse fuerit, hunc re-  
gressum prohibituram: Atque ut hic  
quodque loci restitantis fortè paululùm  
uri-



urinæ molestia caveretur, extillari a canaliculis liquidum demulcens necesse fuit atque præ-commodum. Aliquando sed rarò tamen ad-modum interior Urethræ tunica in viris ad præ-dictorum Canaliū orificia in velæ modum ac Valvulæ speciem elevatur, qua eadem ostia obvelantur. Id tamen per-rarum est adeò, ut pro genuino Naturæ machinamento haberi neutiquam debeat.

In Equo.

Eodem modo locantur ad Urethram *Equinam* Conglomeratæ, hōc discrepantes uno, quòd istæ majorem habeant Conglomeratæ faciem, ut illæ magis quoad externum Conglobatis accedunt.

In Fele domestico.

In *Fele Domestico*, seu *Cato* ad radicem penis duæ adstant glandulæ Prostatis æquales, exiguum una-quæque ductulum in Urethram emittens. Carneæ sunt exterius, interiùs conglomeratarum granulata substantia: nempe nulli subjiciuntur musculo, vel ambiuntur; ideoque externa superficies fibrosa est: nisi fortè comprimuntur

a mus.

a musculis penis Erectoribus, qui prope glândulas hasce ab ossibus Pubis exoriuntur breves quidem sed validi, atq; torosi.

His consimiles sunt conglomeratæ ad radicem penis in *Mure domestico* majore sive *Ratto* ponè musculos erectores sitæ. In Mur domestico majore.

Hujus esse generis autumo Glandulas illas duas albas juxta testes, aliasve duas lutescentes iis minores, quas in *Echino seu Erinaceo Terrestri*, a se dissecto observavit Franc. Vuillughby. In Echino seu Erinaceo Terrestri.

In *Talpa* hasce dari Conglomeratas, aut sanè analogas ex *Schelhameri* observatione facilè judico, quam hisce verbis adducit Jo: Rayus: Corpora ex-

tus carnosæ manifestò, indèque rubicundissima; intus nerveæ, canali nerveo durissimo prædita, qui longè ante vesiculas seminales in penem seorsim inferebantur; porro circa vesicam aliud occurrebat globosum, carneum parte exteriori, interiori nerveum in ipso Pene situm, in quodam ex vesica aditus erat, tum & vasa semen deferentia terminabantur, ex quo Prostata esse apparebat. Sed post banc demum insertionem ex dictis corporibus

Synops.

Hist. Quadrup.



rotundis , canales illi nervei seorsim in penem abibant . Ita se habent bujus animalculi genitales partes , in quibus tantum apparatus baud inmerito admireris . Cum enim reliquis præter testes valde mediocres , quorum Parastatæ appendiculæ sunt , & glandulas Prostatas , vesiculasve , nihil Natura dederit ; huic & maximos illos , & parastatas amplissimas , & reliqua ; & insuper novum corpus seminale , ab his diversum ac separatum , novis ductibus instructum concessit , penem & facile omnium ( ni fallor ) animalium longissimum . Huc-usque citatus supra Jo: Ray .

Analogū  
quidpiam  
in Lima-  
cibus ter-  
restribus.

Osserv. in-  
torno agl'  
Anim. viv.  
che si trov.  
negl' anim.  
viv. p. 43  
Tav. XII.  
Fig. 2. let.  
mmm. l.

Glandulis istis aut Prostatis analoga videtur glandula illa , quam accuratissimus Naturæ scriptor Franc. Redi , prope hepar in Cochleis nudis , seu Lima-  
cibus terrestribus , quas apellat Lumaco-  
ni ignudi , accuratius observat atque de-  
scribit : Ma siasi in che stato si vuole il  
testicolo , o che-che sia , sempre in quel-  
la parte co' la quale egli sta co'l vaso sper-  
matico , à la sua estremità un altro ca-  
naletto sottilissimo pieno di materia bian-  
ca grossetta , il quale camminando per lo  
più



più a serpe a traverso del ventre senza avere attaccamento veruno nel mezzo, coll' altra estremità più sottile si attacca, e si ramifica nel fegato, o per dir meglio in un corpo glanduloso, di figura, e di composizione di parti simile al fegato, ma di colore un poco più rosso; il qual corpo è abbracciato, e circondato dal medesimo fegato, che è di lui cinque, o sei volte maggiore.

Ita & in Lepore marino, quem apel-  
lat Lumacone marino; de quo inquit:  
Le viscere interne, come gl' arnesi tutti  
della generazione, il polmone, il cuore,  
il canale degli alimenti son molto, e mol-  
to simili, e corrispondenti a quelle de' Lu-  
maconi ignudi terrestri.

*Ibidem.*

In Lepore  
seu Lima-  
ce marino.

Pariformiter in Limacibus Cocblea-  
tis, seu propriè dictis Cocbleis: all' in-  
torno del testicolo scappa fuori un sottil  
canaletto, che sciolto, e serpeggiante vada  
ad impiantarsi in un certo corpo rosso glan-  
duloso situato, e nascosto nel mezzo di  
quella massa che fanno gl' intestini, ed il  
fegato aggrovigliati insieme.

In Co-  
chleis.

Id. Ib. p. 50.  
Tav. XIII.  
Fig. 3. Let.  
F. e e e e.

In Canibus conglomeratas hasce  
glandulas comperire non licuit: fortè

In Canino  
genere glan-  
dulæ nullæ



quòd Prostatae ad aliorum Animalium proportionem grandiores minorum istarum defectum satis supplere poterint.

Canalium  
a Glandu-  
lis huma-  
nis Descri-  
ptio.

Glandularum verò humanarum Canales excretorii principio suo sub Urethrae membrana altius demerguntur intra corpus spongiosum, cuius vasis in ingressu suo proximè ad initium ambiuntur, atque muniuntur; indè membranam Urethrae internam subeunt, ad cuius interiora paulatim emergunt, ut totà ferè longitudine sua urethrae superficiem excurrentes, velut anaglypticè delineati, levique dorso prominuli appareant.

Quò Glandulae propior Canalis est, & cavitas illi major, & tunicae sunt constantiores, quò magis recedunt, cavitationis habent & roboris minus, sed utraque in progressu ad finem usque insensibiliter exilescent.

Deferuntur ductu non recto, sed aliquantulum obliquato: Namque cum primum ad Urethrae superficiem emergunt emicantve, a se invicem recede-

re incipiunt, receduntque paulatim, mox cursu medio superato iterum mutuò inclinantur, ut illorum extrema ferè ad contactum aproximentur, exiguo non nisi relicto intervallo, sicque Canales singuli subcurvam lineam, simul autem clipsim prope, describunt.

Canalium etiam extrema non libere in Urethram hiant, sed paululum intorquentur & flexuosa fiunt in exitu suo, quod maximè apparet quoties ductus comprimitur, & liquor ad exitum urgetur. Hinc maxima setas suillas etiam minores insinuandi difficultas patienter superanda, quæ in reliquo, nisi fortè ad canalis in tunicam, Urethræ trajectu, nulla ampliùs occurrit.

An fortè *meatus ille novus sed exilis concavus, quem in homine invenit Jo: Daniel Major cum Casp. Marchio, qui ex porositatibus Prostatarum in Urethram educitur & terminatur, per quem seminalis ille liquor in fistulam stillat* referente Th. Bartbolino, illorum sit unus Ductuum,

*Anat. lib.  
I. De Inf.  
ventr. Cap.  
XIII. De  
Vas. Defer.  
&c.*



Etuum, quos invêni ( ut candidè fatear ) nihil certi possem statuere, cum Auctor a *Bartholino* citatus ad manus meas nundum pervenerit, licèt Ejusdem Consultationes Medicas aliquot viderim relatas ab altissimi nominis Viro Medicæ toto orbe Universitatis Bibliothecario, de rebus Anatomicis, Chymicis, Pharmaceuticis, Medicis optimè merito, Jac. *Manget* in suo, verè *Tbesauro Medico-Practico*. Quatenus tamen ex *Bartholini* relatione constat, non puto Adversario fortè alicui ansam dari posse ut Glandularum, Ductuumque Nostrorum novitatem audeat impugnare.

Similitudo cum canalibus uteri vacuicinis.

a De Mulier. org. Gen. insert. b Dissert. De Utero. c De Ovar. Mulier. Epist. ad Gul. Rivam.

Propius est ut Ductus Nostros comparem Canalibus liquorem pituitososerofum ad Urethræ confinia in Uteri Vaginam deponentibus, quos in Muliere detexit *Graaffius*,<sup>a</sup> in Vaccis *Malpighius*,<sup>b</sup> & tum in Vaccis tum in Mulieribus elucidavit *Casp. Bartholinus*<sup>c</sup> a *Clarissimo Du Verney* Regio *Parisiensium Anatomico* primum ( ut ipse fatetur ) edoctus. A Glandula nimirum



mirum ex plurimis aliis ( ut *Bartolini* ) seu a folliculis subrotundis glandulosis ( ut *Malpighius* vult ) conglomeratâ in Vaccis, in Mulieribus verò a Corpore Glandoso Prostatitis virilibus persimili, Canales duo, in Vaccis satis spectabiles, in Mulieribus portione longè minores, hi stylum, hi setam duntaxat suillam, admittentes ad Vaginæ latera emittunt, qui latô capitulô evidentique hiatu ( ut cum *Malpighio* ) seu conspicuo & in Papillam protuberante ostio ( ut cum *Bartolino* loquar ) in Vaccis, nullâ in Mulieribus protuberante Papillâ, supra meatus urinarii orificium, subviscidum liquorem emittunt, quo & lubricatur, & in venereo clysmatico opere delectabiliter inspergitur plena voluptatis fœminarum vagina. Immo quavis comparatione aptior & accommodatior illa est Glandularum nostrarum similitudo cum Glandulis hisce duabus, quas ad Leporis fœminæ vaginam, Testiformes apellat Jo. Jac. *Harderus*, atque describit *ex albo-flavescentes, magis quoad*



Schol. Ob-  
serv. IX.  
Fig. I. Lit.  
b.

quoad externam faciem quàm internam  
Conglobatis similes, dissectas & pressas  
tumorem e suis porulis hìc illic reddentes  
albidum crassiusculum, qualis in non-nul-  
lis animantium Prostatis deprehenditur,  
corpore tortuoso sub-fusco velut epididymis  
utrimque ambitas, unde ductus tortuosus  
ceu ejaculatorius prope orificium externum  
interius inseritur.

Traductam a Malpighio & Bartoli-  
no canalium horum descriptionem,  
fortè nimis obscuram ne culpes ( Ami-  
ce Lector ) utpote ex Clarissimis Vi-  
ris excerptam, contractamque eo so-  
lùm consilio, ut institutam Glandu-  
larum ductuumque novorum cum il-  
lis analogiam juxta-positione eviden-  
tius demonstrarem, utque etiam con-  
firmem Glandulas, quas superius ex-  
posuimus Urethræ Disgregatas cum  
Glandulis & canaliculis, quibus Vagi-  
na, totusque Uterus irrigatur, analo-  
gas esse.

Cum Pro-  
statis vtri-  
libus.

Quibûs jam constantibûs probatâ-  
que aliunde a præcitatis Authoribus  
harum Vaginæ Glandularum cum  
gland.

glandoso marium corpore seu Prostatis comparatione; facilis Tibi largirer (Lector Prudentissime) ut si fortè Glandulis nostris (ut novis rebus solemne est) novum procudere nomen ad clariorem intelligentiam utile censeas, illud ab instituta analogia eruas, & *Astites conglomeratas*, seu *Prostatas minores* denomines, quibus liquor tum muliebris tum virilis Glandosi corporis liquori analogus excernatur, velut qui insensibiliter percolando Urethram irroret ne exsiccet, subliniatque ut ab urinæ seminisque acrimonia muniatur; impetuosè autem projectus Urethram suavissimè afficiat in coitu. Ut idè superius exposito Urethræ Disgregatarum usui, similis non modò, sed idem omninò Conglomeratarum apareat.

Et indè  
Cognomina-  
tio.

Ufus.

Qualis  
Disgrega-  
tarum om-  
ninò,

Ne verò per Urethræ longitudinem istæ fuerint (illarum more) dispersæ, per tractum videlicet a Prostatis ad usque ubi nunc aperiuntur earum canalialia, seu (quod idem) ubi pullulare incipiunt Disgregatæ; prohibuit fortasse necessitas compressionis, cujus

Ratio.

L

ut



ut indigæ erant, ita obtinendæ minùs aptæ, hujusmodi in tractu, ubi fistula urinaria superius corporibus nervosis partim sejuncta, partim laxiùs unita, inferius spongioso corpore multo, velut tomento obfarcta, compressionibus aut destituitur, aut cedere satis ad glandularum expressionem non potest. Colligi itaque ac velut confluere illuc omnes debuere, ubi potentiam muscularem oportune advolutam sibi possent nancisci. Sicque major colligi humoris copia, unoque jactu emitte potest quàm major fortè est ejusdem, & quidem copiosioris necessitas, uti superius conjectabamur in Brutis; in illo videlicet freto, in quod ab Acceleratoribus suis angustatur Urethra, ut illac arctiùs fluente semineo, urinosoque liquido, faciliùs posset exuri.

Vid. pag.  
71

Quoniam verò liquor iste fluxilior tenuiorque esse debuit ut longiusculo exiguoque canali tranando par esset, minus congruum Naturæ fuisset glandulosa mole Prostatas augere, ab iisque liquorem istum petere, a quarum  
pro-

propria textura non nisi viscidiusculus humor secerni consuevit; nisi fortè id in canibus præstitum, quibus prostaticarum liquor, analogo Conglomeratarum adstitum liquori fortè permixtus, videtur longè serosior.

Cum hisce usibus liquidum istud inserviat, ut vel sola rei expositione, ac contemplatione ex insinuatīs Capite præcedenti liquet, facilè intelliges rerum Mechanicarum & Anatomicarum peritus, in hoc opere tale esse Naturæ artificium debere, ut passim, lentè ac sensim flueret hoc liquidum in ordinario statu, & data occasione impetuosius profiliret, ut de Disgregatis disseruimus supra.

Ut ergo passim in Urethram flueret hoc liquidum, nullam emissario Canalis muliebris aut virilis apposuit carunculam aut papillare impedimentum, ne cum assiduus, aut ferè assiduus saltem esse debeat liquoris proventus, in assidua, vel ferè assidua actione Potentias detinere cogeretur: quod cum nimis implicitum evaderet, non

Nulla ad  
canalis  
exitum car-  
uncula.



oblitæ machinarum suarum, sed bene-sapientis Naturæ fuit Carunculam, aut Papillam deficere : opposita autem ratio voluit Carunculâ Deferentium orificia, Papillis Prostatarum canaliculos muniri. Quamquam & illud Astitum conglomeratarum canales ab hoc objice potuit liberare, Urethræ necessaria nimium æqualitas papillæ elevatione facilè ledenda.

Sed ejus  
loco aliæ  
resistentiæ

Harum resistantiarum loco remoras plures habet hoc liquidum in se ipso, in Glandula, in canali suo: in se ipso propriam visciditatem; in canali extenuationem parietis, & cavitatis suæ, canalis ascensum, obliquitatem, extremique intortionem; in Glandula minorem cedentiam & compressibilitatem, qua fit ut difficilius urgeri introrsum tota glandula singulique acini possint, unde alioquin promoveri secretiones & secreti liquidi fluxus non est ut hic loci probemus.

Ut colligatur tantisper liquidum.

Hæc inquam omnia facilè puto ut in ordinario statu sensim & lentè fluat hoc liquidum. Eidem usui Canalis Vac-

cini

cini emissario apposita est Papilla, velut canalibus Deferentibus Caruncula, & canaliculis Prostatarum in Urethram hiantibus Papillæ, ne vel noxiè vel inutiliter prodigeretur liquor, sed oportunis temporibus cumularetur, quibûs abundanti profusione usum cui destinatur meliùs præstaret. Huic usui cui Papilla in vaccinis Canalibus, sufficit liquoris visciditas, & exilitas extûs in Canalibus muliebribus, recensitæque resistentiæ in Virilibus. Quæ propter copiam liquoris nitentis in emissarium in Vaccis fortè minùs sufficiebant, sed aliud impedimentum, Carunculæ scilicet, fuit moliendum.

Hæ resistentiæ utcumque leves aliquo saltem momento sunt superandæ Potentiæ sunt. potentiis ad Glandulas & Vasa oportunè adhibitis; his inquam potentiis, eoque artificio applicitis, ut ordinariò velut otientur, & levem saltem actionem exerentes, hujus liquidi secretionem, excretionemque lentè procurent. Datâ verò necessitate agant validiùs, quin etiam aliquando validissimè.



Mites ita-dixerim potentia sunt Arteriae & Vasa Glandulae distributa, eisdemque & Canali adjacentia. Nimirum a vasis proximis surculi in plures discerpti ac ferè reticulati singulos exterius acinulos irrigant, ac intercepta acinulis spatia subeundo Glandulae meditullio altiùs infiguntur.

Adjacet verò Glandulae Arteria, corpus Urethrae spongiosum irrigans, quæ postquam Glandulae ramos distribuit, Arteriae, ejusdem regionem præter-gressa, duplici ramo in corpus spongiosum inseritur. Ductibus excretoriis accumbunt Vasa ipsa Urethrae corpus spongiosum contexit, quæ ideò providè canalis exortum statim arctiùs complectuntur, reliquum comitantur adjacentes.

Cum Venis supra Glandulas reticulatae

Vasa itaque liquidum Glandulae inferentia non ad nutritionem ac vitalitatem modò, aut ad secretionem quomodo-libet illud suppeditant, sed ad liquorem secretioni disponendum, discernendum, secretumque jam promovendum in fluxum ad proportionem parvitatìs in Glandula & liquore suo aptissimè

tissimè comparantur. Nimirum Glandulam involvens exiguus ille vasculorum reticulus quantum (ad proportionem exiguæ etiam Glandulæ) mutuis fluentis intra ipsum sanguinis incursibus & allisionibus, & per consequens divulsionibus a cohæsione sua, ad secessum partis a parte, seu ad secretionem disponat, patet ex iis, quæ de reticulorum vascularium usu in animalibus solidè non minùs quàm facundè disseruit Vir prodigiorum in Mechanico-Medicis *Laurentius Bellini*.

Contractio insuper & distractio Arteriarum præcipuè, tum quæ Glandulam subeunt, tum quæ ad Glandulæ contactum excurrunt, nisu distractionis suæ vel Glandulam totam ad contactum positam, vel unam-quamq; Glandulæ partem, inter duas quasque Arteriolas compræherensam, alternè compri- mant, alternè liberam a compressione relinquunt, ac alternè liquido suo impleri Glandulæ utriculos, alternè secretum in sinulis liquidum agant in canales suos, & extra canalem derivent.

Glandulis  
adjacentes  
per easque  
distributæ.

Insu-



Urethræ Vasa. Insuper adhærentia per Canalis longitudinem, aut transversè, ad initium præcipuè, vasa spongiosum Urethræ corpus contexit, cum distractilia sint & contractilia, erunt & ipsa potentiolæ quibus liquidi fluxus & exitus promoveatur. Potissimum contra impedimentum visciditatis, necessarium fuit potentiolas seu motus distribuere seu digerere ad superficiem externam canalium, quibus canalis sectim premeretur, ac urgeretur introrsum, ut tum a mutuo contactu, tum a contactu parietum divelleretur liquidum, & singulæ moles liquidi agantur vel ad immissarium, vel ad emissarium, ut indè a liquido super-affluente ex immissario versùs emissarium, immo & extra determinetur, quà patet exitus.

Inminutio  
resistentiarum.

Rursum ut in hoc canali fluxui remoram facit cavitatis extenuatio, sic facilitatem aliquam præstat membrarum gracilescentia.

Rursum ut conica vasculi figura impedimentum efficit ad fluxum, ita facilitatem præstat inæqualitas momentorum

torum quibus canalis præditus est: neque enim momentum suum denegandum est membranulis canaliculum constituentibus, cum instructæ sint facultate contractili. Cum enim crassiores sint tunicæ ad inmissarium, seu propè glandulam, tenuiores ad extremum, seu emissarium, fiet, ut ad inmissarium canalis major sit facultas contrahens, minor versùs emissarium: Quare contentum liquidum sensim urgebitur ab inmissario versùs emissarium, nempe a loco ubi crassities villorum major est, atque ideò major validitas facultatum contrahentium, & momentum earumdem majus, ad locum ubi villorum crassities minor, ideòque momenta contractionis minora.

Quo-ad canalis intortionem probabile est eo tempore, quo major exigitur liquidi copia, ex obliquo directum fieri, distentâ nimirum Urethrâ.

Momentosa autem magis potentia musculus est, qui valido involucro glandulas utrasque ambit, atque completur, quem subsequente mox Capi-

Advolu-  
tus mus-  
culus.

M

te



te exponam : postquam candidè professus fuero quod hoc ipso momento contigit, sinè publica professione ne-  
tquam prætermittendum:

*nec si miserum fortuna Sinonem.*

*Finxit, vanum etiam, mendacemque im-  
proba finget.*

*Virgil. Ma.  
Æneid. l. II*

Huc usque jam planè deveneram;  
cum amicissimus unà ac Clarissimus  
D. Joseph Paschalis me perhumaniter  
moniturus, retulit Mons. Mery ( Accu-  
ratissimus ille, & exactissimus Pari-  
siensium Anatomicus, nunc Regii No-  
socomii (l'Hotel Dieu) Chirurgus prima-  
rius) a aussy decouvert dans l'homme sous  
la partie virile deux petites glandes de la  
grosseur d'un pois. Elles sont placées au des-  
sous des muscles accelerateurs, & éloignées  
du corps des Prostrates d'environ un ponce.  
Officiosum benevolentis Viri monitum  
non maximè gratum habere non potui  
utpote quo aut negligentis aut plagiari;  
notam, quæ mihi (ut candido cuique)  
semper teterrima visa est, longiùs decli-  
narem; quoque palam professò eum me  
hominem præstare, qui agere omninò  
velit ingenuè.

Pro

*Journal  
des Sçavans  
Tom. 12.  
A. 1684.*

Pro hoc utique candore, pari mihi libertate liceat apertè dicere, me glandulas istas ex me non invenisse modò, sed & qualis sint naturæ (conglomeratarum videlicet) quo canali, quòque liquore præditæ, quos usus, quibusque mediis præstent, quibus, qualesque in brutis adsint, quibus, qualiterve denegatæ suppleantur analogis instrumentis, exposuisse; ut quibus præcipuè morbis obnoxia sint mox enarrabo: quibus sanè desideratis, næ ego glandulas illas a me inventas, aut satis perspectas habuissem.





## CAPUT IV.

*De Glandularum Urethrae Conglomeratarum musculo.*

Muscularis Emboli  
necessitas  
ad fluidorū  
motus.

**A**ST ubi difficilioris momenti occurrit resistentia, validioris quoque momenti potentiam applicari animalium mechanices, seu mechanicæ peritiae plenum artificium naturæ voluit. Hæ potentia illæ sunt quæ majori vigeant momento contractionis, nec sola instructæ sint facultate contractionis naturalis, sed etiam contractionis super-additæ; nempe instructæ sint villo contractili, seu fibra motrice carnea, quibus facultates contractiles constituuntur. Id sapientissimè factum jucundissimè observamus in canalibus conicis, in quibus liquidum de se ipso iners fluere debeat a latiori inmissario in canalem vel emissarium angustius; ad superandam occursum resistentiam ad singula canalıs segmenta, vel ad inmissarium, potentia muscularis ad coni basim apponitur, velut  
ad

ad basim seu inmissarium coni, seu conici canalis arteriosi musculus cordis constituitur, cujus vim, agendi modum, & æquilibrium; in sê, ad canales, & liquidum suum doctissimè Præclarissimus *Baglivus* exposuit.

*Tract. De Fibr, motr. & morb. specim, l, 1.*

Et quum hæ resistantiæ potissimùm occurrant ad secretionem, & excretionem liquidi per glandulas, & canales suos, industrie Naturæ artificium potentias musculares ubique adhibuit, quibus a glanduloso corpore exprimeretur in inmissaria seu canaliculos excretorios, ex his urgeretur in canalem communem, tandemque in emissarium, sicque superaretur quidquid resistantiarum adest in glandula, in canali, in contento liquido. *Exemplum*

*Ad secretiones & excretiones.*

*luculentissimum & veluti maximam glandulam patentem oculis habes in Intestinis ex Bellino:* Machinam comprimantem in abdominis musculis, qui momenta sua cum dirigant ad singula puncta contentæ cavitatis, aguntur quòque vi contractionis suæ, videntque super intestina tanquam super magnam glandu.

*Opusc. De mot. cord., de ferm. & gland.*



dulam, & in Lactea agunt, & per ipsa tanquam per canales excretorios urgent; Ut magna hæc secretio in magna hac glandula musculosis planis plurimis efficitur, sic reliquæ in animalium corpore secretiones in glandulis musculosa fibra perficiuntur.

Liquido-  
rum præ-  
sertim pi-  
griorum.

In iis verò præcipuè secretionibus, quibus fluidum iners separatur, quasque repentinis quibusdam motibus aliquando fieri uberiores oportuit, muscularem potentiam præfecit. Cum enim tale fluidum non sit sufficienti instructum impetu ut possit sê-ipso fluere, debet eundem aquirere a compressione extrinseci, ideoque ab aliquo contractili, & cum major datis temporibus emunctio liquidi necessaria sit, ideò major contractio comprimentis involucris, quare involucrum illud non solum naturali, sed etiam super-addita contractione contractile sit oportet. Fasciculus autem naturali, & super-addita contractione contractilis quid aliud esse nisi musculus potest? Hinc cum salivæ uberior proventus in-

ter

*De Gland. Ureth. Cong. musc. 95*

ter masticandum sit necessarius, ejusdem glandulis & ductibus admovit potentias, quæ inter masticandum agitantur quas exponit *Casp. Bartholinus*.

At quid ego de musculis super intestina, & supra glandulas reliquas vigentibus? Quid ego de glandulis salivalibus? ut ostendam necessitatem

Existencia  
ad glandu-  
las Vacca-  
rum vagi-  
nales.

musculi glandulis nostris super-imponendi. Exempli certissimi, & plenæ analogiæ loco ponam quod de glandu-

lis suis vaginalibus habet *Casp. Bartho-*

*Epist. ad  
Gul. Rivam  
De ovar.  
mulier.*

*linus*: Nimirum Præclarissimus Au-

ctor hæc glandulas (Vaccarum vagi-

nales) fibris carneis peculiaribus & pro-

priis undique investiri observavit: quia hu-

mor externi non potest nisi protuberante pa-

pilla, prospexit Natura glandulæ fibris

carneis, quibus in actu venereo, cum li-

quor exernendus est, premerentur glan-

dulæ, ut papillæ protuberarent. A Sphin-

ctere vesicæ videntur hæc fibræ carneæ ori-

ri, quem-ad-modum & Virorum Prostra-

tas a musculosis fibris super-impositis a

Sphinctere vesicæ oriundis contrahi asse-

rit *Regn. De Graef*. Quin & glandulas

illas,



illas, quas in *Talpa* Prostatas conglomeratas, aut iis saltem analogas ex

<sup>b</sup> *Cap. 3.* *Rayo* retulimus supra <sup>b</sup>, musculari involucro minimè destitutas observo ex hisce met. Auctoris prælaudati verbis

<sup>c</sup> *Synops.* *c*: Cumprimis verò considerari dignum *an-*  
*Hist. Quæ-* *nes* *bas* *partes* *carnosis* *tegumentis* *muniti,*  
*drup. Tit.* *ex* *quo* *manifestum* *fit* *contrahi* *eas,* *at-*  
*Talpa.* *que* *sic* *seminalem* *materiam* *propellere* *&c.*

Præter necessitates itaque quas communes cum glandulis omnibus conglomeratis & præcipuè cum salivalibus habent nostræ conglomeratæ, cum uteri conglomeratis glandulis *Malpighianis* aut *Bartholinianis* peculiarem habent necessitatem mechanicam ut eodem, quo illæ, modò, iisdemque rationibus carneos sibi lacertulos, fibrasve musculares adsciscant, qui naturali contractione, & compressione sua liquidum a glandula sensim exprimant, & per canalem sensim urgeant: contractione verò super-addita liquidum glandulæ & canalis velut embolus in syringa impetuosè projiciant.

Mus-

*De Gland. Uretb. Cong. musc. 97*

Muscularis iste fasciculus portio est musculi urethram constringentis, quem non-nulli apud Galenum .a. appellant Sphincterem, seu strictorem; uti post Galenum Vesalius .b., Valverde .c., & Vesaliani cæteri, qui pro genuino vesicæ Sphinctere attulerunt: Riolanus .a. Sphincterem vesicæ externum, Lindanus Spleniatum, seu Fascialem appellat.

Musculus ad Adstites cōglomeratas.

.a. Anat. Admissist. lib. vi. cap. xiv.

.b. Anat. de Corp. Hum. Fabr. lib. ii. Cap. L.

.c. Lib. xi. De Musc. Cap. xxxiv.

.d. Enchyrid. lib. v. cap. xiv. de musc. ves.

C A P U T V.

*De Morbis Glandularum Uretbræ,  
& speciatim Gonorrhœa.*

UT pars organica quælibet, nullenſ obnoxia læſionibus est, ac cruciatibus exercetur Urethra virilis, suo, vel partibus aliis, præsertim viciniſ comuni vitio. Præternaturali genesi meatus ad Glandem impertoratus contingit .e., ut præter Veterum monumenta

Occlusio à natalibus, & aliò apertio.

Job. & Meckren obs. med-chir., Melch. Fribe obs. 98. misc. med-phys. A. 3., Beniven. c. 9, Bierling. obs. 204, Ephem. med. phys. Germ., Gerb. Elafius obs. med. 5.

N obser-



\**Obs. 106. Misc-Med-phys. Dec. 2. A. 9.*  
*a. Anat. Ref. l. i c. 24., Blancard. inst. chir. par. 2. cap. 14.*  
*b. Jo. Schmid*  
*c. Petr. Sorbait.*  
*d. Hippochr. Aph. Cōvulsio, Paralyfis, Inflammatio.*  
 Tumores varii  
 Sphacelus  
 Excoriatio  
 unde tubercula  
 Obstructio .  
*e. Nic. Tulpius obs. l. 4. cap. 34.*  
*Jo. Burgius, Theoph. Bonetus.*  
*f. Laur. Ferhr, Helvig. & Schroeckius Dan VVinclerus.*  
*g. Jo. Schmid, Dodonæus, Schenckius*  
*h. Pr. l 5. c. 3, Severinus med. Eff. pag. 80 :* ut mihi observare contigit ad  
*i. Inst. Chir. part. 3. c. 20. de Hæmorrhoid.*  
*j. Amat. Lusitanus c. 6. cur. 19., VVincl., Jo. Schmid., Mel. Frib. m. Dodon. Ann. ad c. 77., Ant. Beniv. obs. mir., Fernel. Path. l. 6. c. 10., Schol. Holl. ad c. 50. l. 1. de morb. int; Cardan. com. in Aph. 76. Sect. 4, Hipp. Rondolet. hist. aq., Ronsæus epist. med. 10. & c. n. Molinett. diss. Path. l. 6. c. 8. o. Plumbo Ol. Borrich., pilis plumbeis Sigis. Elsholt., globo sclopet Act. phil. Angl. m. oct. 1668. p. Polyp. viv. Schultz., Animal. millep. simil. Duret., Asell. viv. Jacob., Insect. viv. nigr. form. scorpionis Th. Barthol. hist. anat. cent. 4. & c., Flatu VVolsfg.*

Steph.

Steph. *Blancardo* .i. : Sanguinis  
grumo .l., purê crasso, vermi-  
bus .m., extraneisque .n. di-  
versi .o., & absoni etiam ge-  
neris .p. (de quibus fusè Ephe-  
merides, & Compilatores) ob-  
struitur . Externis, puta tumo-  
ribus, hæmorroidibus, aut duris  
fæcibus, penis distensione, phy-  
mosi, hydrope, inflatione  
.q. premitur, angustaturque :  
Vulnere .r., aut contusione .f.,  
læditur . Ab externâ intem-  
perie communia cum Pene pa-  
titur . Ab intrò-admissis irrita-  
tur, inflammatur, eroditur .  
Vasculorum ruptione, vel ero-  
sione, Hæmorrhagiâ, sanguineo  
mictu .t., ac tincto semine,  
partium seminalium vitiô Go-  
norrhœis inficitur : His aliisq;  
causis ulcere, fistulâque perfodi-  
tur; unde urina loco non conve-  
nienti emittitur .u., aut post ul-  
cus coalescentia meatûs contin-

VVedel. in *epist.* Th.  
Barthol; Ol Borrich;  
*ossiculo* Th. Barthol;  
*pilulâ purgante* Id;  
*Pilis* Dan. Horst.  
*epist. ad* Th. Barthol;  
*Andr Cnæff.* David.  
Spielemberg.

Compressio

.q. Dodon., Schen-  
Kius. .r. *Regn. de*  
*Graaff. de vir. org.*  
*Jo. Huybrechtz.*  
*f. apud* Galenum.

Vulnus.

Contusio.

Intemperies.

.r. *Lue.* Hannæus.

Mictus sanguineus.

Gonorrhœa.

Ulcus.

Fistula.

Coalescentia.

.u. Th. Bartholinus  
*bist. c. 4 p. 422*,  
*Salmuth. cent. 1. obs.*  
*med. obs. 60, nu. 39.*

X..

N 2

Meæ



*Eastbach Rudius l.*  
*2. c. 53. , Am. Lusit.*  
*cent. 2. cur. 21. ,*  
*Platerus obs. c. 792.*  
*.cc. Jo. VVierus.*

Proprii Glandula-  
 rum Urethræ .

*.g. De morte subit.*  
*lib. 3.*

In Solidis.

Mæx autem operæ pretium est illos duntaxat morbos exponendos assumere, qui à Glandularum exaratarum vitio pendere propiùs videbuntur. Et quidem, cum partium omnium morbi à solidi, ac liquidi ejusdem partis læsione dependeant ( quod nuper illustravit Illustrissimus ipse Summi Antistitis Medicus, & Medicorum primus Antistes Jo: *Lancisus* .g. ) ità istarum morbi ab horum vitiis sunt omnino petendi.

Ratione igitur solidi, causa morborum in hisce glandulis erit quidquid glandularum quantitatem continuam vel discretā, vel internam structuram, aut libertatem canalium, aut motum potentiarum ad glandulas lædere potest. Ratione fluidi quidquid liquidū harum glandularum minuere, augere, incrasare, solvere, acuire, aut consimiliter modificare aptum est.

Eaq;

Eaq; vel à primordiis, vel ad. Natales.

ventitia. Nimirū velut ē partibus geminatis alterutra, sic ē multiplicatis aliquæ [ naturā subindē in organis præsertim genitalibus ludente ] deficiunt, exceduntve.

Primum in Conglomeratis .a., secundum in Disgregatis contingit. Major minorve moles evenit, aut proportionata reliquis partibus, aut improporcionata: ità densitas, aut laxitas; ità canalium conformatio; sic & potentiarum appositio varia, non sinē aliquo, levi saltem, officii detrimento. Aberrare etiam posse quis dubitet Adstitum canales? quem ad modum ductus salivalis apud *Kerkringium* Spicileg. Anat. obs. 68.

*a. Fortè in Andria Martel apud Georg. Abrab. Merchlinū, & in aliquibus ex Hermaphroditis; fortè etiam in illo, cui à nativitate, Penis pro ano fuit nullā cum vesica urinaria VWolf. Striegel. in litt. Viennā datis ad Sachsum.*

Adventitiæ solidorum læsionis aliæ ab externis sunt, aliæ ab internis. Primæ in re præfenti sunt vulnera, contusiones, stimuli. Secundæ sunt Glandularum congestiones, vel exeffiones

Adventitii

Externi.



siones, canalium corrugatio, compressio, obstructio, potentiarum adjacentium paralyxis, vel convulsio, quatenus ab aliorum solidorum vitio, aut à liquidis pendent laxitatem nimiam, aut rigiditatem, aut consimilem intimioris structuræ labem glandulis, aut partibus adjacentibus lentius citiusve inducentibus.

**Vulnus.**

Vulnere pariter ac contusione continuïtas, ità ac structura, vulnere autem quandoque magnitudo etiam, & numerus læditur. Porro ex vulnere harum glandularum præsertim Adstitum, atque earundem canalium non nulla evenisse incommoda possunt, tùm illa maxime quæ vulneratis Glandulis.a., earumque Lymphaticis.b., atque in Salivalibus præsertim superioribus, & lachrymalibus contingunt; quod ultimum evenit magno *Hildano* .c. curanti, sed ista ne.

a. De conglobatâ inguinali *Frider. Ruysch obs. anat. Chir.*, *Fabr. ab Aquapend. l. 1. de. tumor. cap. 13.*

b. *Jo. Muys. in Prax. chir. ration.*

nescienti, quodque clarè expo. *c. Cent. 5. obs. 80.*

nit Joh. Munnick's. d. Nempe ut

glandularis lymphæ passim ex-

tillet, præsertim in ejusdem par. *d. Chir. ad prax, bod. adorn. cap. de*

tis motionibus, fonticulo diffi. *vuln. fac.*

cilè exsiccabili, & aliquando

in fistulam abeunte; ut ex sau-

ciato salivalium altero in Mili-

te Regiminis *delle Guardie* unà

cum Domino *Pancalio* observa-

bam. Hæc tamen non adeò ti-

menda in Adstitum earumque

canalium vulnere, quàm sit in

salivalium, propter glandulæ

canalisque exilitatem, & liquo-

ris cum paucitate visciditatem,

licèt inflammata tùm parte af-

fluxus major fiat. Aut post vul-

nus coalescit, occluditurque

meatus, canalis reliquo ad usq;

glandulam facilè in folliculum,

seu sacculum dilatato. Ghirur-

gis præsertim Lithotomis in sectio-

ne pro calculo vesicæ, & ma-

gis urehræ in hoc situ has glan-

dulas, hos canales propono.

Con-



Contusio.

Contusione fibræ, ac nervi tum glandularum, tum partium appositarum distrahuntur, distorquentur, laxantur, franguntur; vasa comprimuntur, dilatantur, & contorquentur, aperiantur, lacerantur; unde liquores universales, & particulares glandularum impediuntur, effunduntur, stagnant; unde tumores, inflammationes, sphaceli, ulcera, glandulis, partibusque vicinis non difficilè super-venient.

Exercitationes violentæ ad partem.

Perfricatione fibræ tum nervæ, tum musculares motitantur, & ad frequentes contractiones, oscillationesque adiguntur; adeòque tubulis ad glandulas deferentibus, aut eferentibus irregulariter percussis, liquores mox vividè pelluntur, mox otiosè relinquuntur, mox strictè impediuntur in fluxu suo, semper tubuli, ac præsertim sinuli fibrarum, & glandularum

rum distenduntur, cum repetitis potissimum percussionibus liquores majorem in parte motum concipiant, atque rarecant. Hinc multiplicato, ac adaucto confertim motu ad partem, impeditoque passim regressu pars velut inflammatur, exprimitur affatim liquor Glandularis, etiam quandoque sanguineus. Sed & crebrioribus distensionibus vasculorum ac sinulorum, tum fibræ tum glandulæ cavitas laxatur, distorquetur, immutatur; Unde laxitas, attritio, aut consimilis peruersio in vasis, textuve fibroso Glandularum, aut potentiarum adjacentium, quâ stagnationes ac impedimenta fluxûs humorum in glandula, & canalifient .a. ; aut in cribris glandularum aut in canalibus, quâ nimia fiet harum Glandularum expressio; adeoque & majori pressione, & maiori copia liquidi extendentur tum secretoria tum excretoria Glandularum. Quamobrem ab hoc fonte nimie oscillationis æquè nimios effluxus seminales, aut semini-formes è glandulis etiam uretræ,

a. Veluti fit  
nodus virgæ  
Iob. Ionitæ  
Synthagn.  
Med.



*\*Ut rumque* trihæ, ac impotentiam, tum â nimio coi-  
*ab hac cau-* tu, \* tum â diuturnis equitationibus  
*sâ in Nob.* b. fieri posse autumarem. Prioris exem-  
*Juv. Joa.* plum habes in Juvene mastuprante  
*Fortis loc.* apud Balth. *Timæum. c.* Secundi cum  
*Infrâ cit.* utroque vitio apud Jo. Jac. *Manger*, in  
*con Ignav.* consultatione pro Nobilissimo: *Penis*  
*ad Ven.* 2. pro Nob. *Flacciditas cum aff. hypoch. &c. d.* Utrius-  
*B. Jac. Fō-* que simul apud Io. *Fortem, cons. valor.*  
*tanus cons.* sem. imbecil. .e., & cons. diffis. erect., aren.  
*2. pro Nob.* miēt. .f. &c.  
*b. Vid. Hip.*  
*de terr. aq.*  
*& loc. In*  
*Schyttis,*

Interni

Stimulus

Consimilia contingent â stimulo  
 consimiliter, licet validioribus momen-  
 tis, operante, validum tremorem, &  
 subtilissimarum partium excursus per  
 eorundem filamenta inducente: Unde  
 vel rigiditate suspendet, vel contractio-  
 ne validâ, vel maxima nervorum suc-  
 cussione promovebit secretionem; &  
 tandem attritis non solum, sed & ero-  
 sis filamentis laxitatem, stagnationes,  
 exesiones inducet, ut patet â superiori  
 Paragrapho, & â naturâ stimuli. Sti-  
 mulum ad glandulas nostras potest effi-  
 cere calculus, vel in eadem urethra, vel  
 etiam in vesica, qui velut in Glande do-  
 lorem

lorem ac pruritum, sic etiam totà urethrà irritationem ac titillationem potest efficere; ità arenulæ grandiores, urina Compressio. acris, vel per se, vel per medicamenta acria, præsertim cantharides, injectiones erodentes, & consimilia.

Adjacentium quoque distensio nimia vel morbosa. Nimia ut in supra dictis de nimia ad hanc partem oscillationis causis, difficilique fœcum egestionem; Morbosa, ut priapismoide corporum nervorum tensione, eorumque, Glandis, Vesicæ, Ani inflammatione. z., vel quavis lædente ad contactum glandularum, vel canalium tumiditate, vel excrecentiâ, x., vel extraneo hujusmodi.

Porro liquoris vitium in glandulis tum Adstitibus, tum Disgregatis præcipuum erit defectus aut exuberantia, crassities aut dissolutio, hebetudo vel acrimonia.

Defectus vel à defectu hujus liquoris in toto, ut in nimia humidi absumptione à dispeptis iisque peculiaribus; præsertim calefacientibus, calida & sicca aeris constitutione; aut glandularum

x. Hipp. Aph. 63.  
x. Ut in canalibus salivariis observavit Steph. Blæcardus Inst. Med. l. 12. atque ego etiâ in militum regiminis Pedemontani Pedestris c. D. Scanzio observabam Defectus.



*a. pag. 101.* exilitate, vel defectu à natalibus *a*, aut  
*b. Colleg. præct. spec. de morb vir & mulier.* inminuto, ablato, depravato ve per flacciditatem, vel tensionem, paralyfim, vel convulsionem potentiarum elatere naturali vel superaddito, uti quæcumque Penis flacciditatem possunt efficere apud Mich. Ethmullerum; aut exhaustis à nimia venere, exercitationibus \*, stimulis †, aut stranguriis humiditate sua viscicà, qua obliniuntur glandulis; Aut injectionibus adstringentibus, impedimento obstructionis, vel compressionis. Casum habetis apud Bened. Sylvaticum *c.*; Aut liquoris debili appulsu, impropor-  
*c. Cōs. & resp med. cent. 3. De Dysur. pro Nob. Angl. d. Cons. & Resp. Med. T. I. Cent. iv. Pen flac. e. Id. Ib. Ignav. ad ven. f. Cons. & resp. Med. cent. 4. de tard. sem. ejac pro nob vir Feder. Mart.* tione cum secretoriis, vel coagulatione. Velut defectûs seminei liquoris exemplum habetis apud Jo. Fortem *d.*; A rarefactione *e.*; à debilitate facultatis animalis per nimium coitum apud Bened. Sylvaticum *f.*; à Fascino, & ab aff. hypoch.  
*Id. Ib.* Defectu humoris oleosi urethram lubricantis læsam urethram, cum ardore urinæ, semenque non ita lubricè,  
*Incommoda* citè.

citèque ejaculatum iri animadvertit jam pridem *Galenus*, & ipse confirmat *Jo: Riolanus* g., pluresque à se visos asserit taliter affectos, victu humectante, <sup>d. Enchyr.</sup> <sup>Anat. Pathol. l. 2. cap. 36.</sup> semicupiis, & injectionibus olei amygdalarum dulcium sanatos. Ex hac causa in pluribus affectu quoque præcipuorum viscerum inflammatorio, & febris acuta, aridove marasmo etiam senili defunctis, corii ad ignem exsiccati instar, exsuccam aridamque urethræ superficiem internam observavi. Nec non & ulcera fieri poterunt in urethra, <sup>Depravatione</sup> difficilius quidem, sed eodem modo ac in vesica, ex defectu uliginis etiam suæ, adfuncto præsertim acris superfluenta. Quin & ab ejus modi liquore deficiente, aut etiam in salibus suis, & crassi malè qualificato depravari viderem, inertemve fieri posse, quemadmodum ex deficiente alteratave salivâ depravatur gustatus, ac appetitus minuitur, opinarer ex analogia harum cum alterius generis glandulis.

Augetur quantitas, aut copia hujus liquoris in toto, ut per euchyma, <sup>Ab aucta quantitate</sup> eorumque



rumque certa quædam alimenta; aut majori glandularum proventu naturali, velut in pluribus observavi; aut valido sanguinis Impetu, fortè etiam cum minùs facili regressu, uti contingit supino corpore, faciliq; hujus liquoris secessione, quod in melancholicis præsertim evenit; Obstructione, aut compressione venarum; Stimulo; Pressione, vel actis animi instinctu ad glandulas potentiis, vel adjacentium distensione nimia, vel morbosa; vel earundem glandularum laxitate.

Incommo-  
da.

.a. Tb. Bar-  
tholinus  
Epist. Resp.  
ad Daniel.  
Horstium.

Ab hac copia distendi dolorificè glandulas præsertim Conglomeratas, cum difficultate mingendi; distorqueri, vel perrumpi tubulos excretorios, præsertim Disgregatarum, cum aliqua urethræ laceratione; proritari pollutiones, filamenta in urinis produci .a., gonorrhœas promoveri posse certum est: immò gonorrhœas fieri aliquando ostenditur inferiùs.

A crassitie

Ità crassities in hoc liquore contingit, vel ab universali vitio sanguinis crassi, vel fixi in lymphâ potissimùm; vel à  
laxita-

laxitate partis; vel à frigido, aut quopiam coagulante [ ut acidæ sunt, ac adstringentes injectiones ) suscepto.

Unde obstructio canalium excretoriorum, ut obstructa vascula ejaculantia observat Paul. *Amman*: Et Glandularum, & quæ ab obstructione pendunt inflammationes spurix præsertim, Tumores, tubercula diversæ indolis, & concretiones argillofæ, prout cum impetu, aut lentescentiâ, aut acrimoniâ universi sanguinis, ac reliquorum humorum, glandularum istarum humoris crassities conjungitur. Quem ad modum in glandulis, & canalibus salivariis hystoriam habet *Lentilius .a.*, & *Steph. Blancardus b.*, *H. Roonbuyse .c.*, in lachrymali Ant. *Nuck*. Fortè jam contingere glandularum præsertim *Adstium* tumores, aut per urethræ longitudinem tubercula in Disgregatis: inutile profectò non erit impofterum animadvertere; utpote à quo multa possunt in excretionem tum urinæ, tum seminis, totâque Genitalium œconomia morbesse contingere. Tuberculum illud inter  
col-

*Incommoda.*

*.a. Ephem.*

*A. 4. dec. 2.*

*.b. Inst med.*

*c. 12.*

*.c. l. 2. obs.*

34.



collum vesicæ , & Rectum , dysuriæ ,  
 & stranguriæ causa apud Fabr. *Hildanum*  
*a.* , fortè in *Adstitibus* fuit. Dubiè dice-  
 re possumus glandulas sub cervice vesi-  
 cæ in Franc. *Mullero* observatas *b.* , hu-  
 jus quoque generis fuisse. Fortè bina  
 tubercula utrinque orificio vesicæ for-  
 mæ , & magnitudine testium apposita  
 apud *Bartholin.* [ cent. 1. hist. 23. ) *Ad-*  
*stitutes* fuerunt tumefactæ. Fortassè eti-  
 am lapilli è perinæo pueri educti *c.* ,  
 ab hisce glandulis *Adstitibus* petiti sunt:  
 cum mihi contigerit in Sene Reni-  
 bus, Liene, Pulmonibus calculoso obser-  
 vare in tubulis Prostatarum , & Vaso-  
 rum Deferentium ad Urethræ princi-  
 pium Ejaculantibus, parvos, & inæ-  
 quales calculos molestiam, & impedi-  
 mentum tum urinæ super-lapsuræ, tum  
 semini effluxuro efficientes *d.* : Adcød-  
 que in Glandularum etiam istarum ca-  
 nalibus dari calculus aliquando poterit.  
 Nec-non urethra humore suo fraudat-  
 tur, aut improporcionado alluitur; ut  
 latera urethræ viscoso isto agglutinen-  
 tur potiùs, quàm parietes lubricentur,  
 & ure-

*b. à Salona*  
*Reiselio*

*c. Nic. Pe-*  
*chlinus*  
*apud Bonet.*  
*med. Sep.*  
*centr. T. 1.*  
*lib. 3 de Im.*  
*ventr. sect.*  
*26. cap. 35.*

*d. Huic si-*  
*mile obser-*  
*uatum fuit*  
*à Theod.*  
*De Mayer*  
*ne apud*  
*Frid. Los-*

& urethræ orificium ad glandem potius, ut quandòque contingit, occludatur. Dysuriam quatuor dierum à pituita meatum urinarium obstruente, *a. lib. xiv.* observat *Forestus a.*, ut & aliam ex limoso humore Penem obstruente.

Ab Acrimonia,  
incommoda

Hujus autem liquoris acrimonia ab acri etiam universalium liquidorum crassi, aut per nimiam venerem, aut partis irritationem isthuc conversâ, conjunctis præsertim tenui partis texturâ, fibrarum tensione, vasorum plenitudine naturalibus, vel morboſis, simplices producit Gonorrhœas, & cum inflammatione, abrasione, aut ulcusculis ardorem, ac difficultatem mingendi, coeundique aliquod impedimentum apportat. Aliquando, inquit *Georg. Baglivus .b.*, ut sæpè vidi, gonorrhœa corripuntur etiam homines cum muliere non infecta cocuntes. Id autem contingit in eis quorum sanguis particulis acribus, salinis scorbuticis, vel alterius generis abundat, unde nimio concubitus æstu universa penè liquida in motum concitatioſiorem posita, indulando inclinant ad locum in quo ma-

*b. Tract. de fibr. motr. & morb. specim. 3 reliq. lib. de morb. succes. c. x. de morb. venar.*



\* Ray. Fort. *jor est oscillatio: quæ quoniam est circa va-*  
*l. 1. cent. 1. sa seminalia in inguine; si concubitus ve-*  
*cons. pro nob. virg. bemens fuerit, ac sæpè repetitus, singulæ*  
*a. lib. 24. partes acres salineque, tunc excitatæ, &*  
*cont. 3. c. 1. in motum positæ deponi circa pudenda in-*  
*b. De hum. corp. fabr. cipient, semelque incepta depositione, ve-*  
*l. 5. c. 13. luti unda sequente undam, aliæ quæ rema-*  
*c. Cam. To- mas. meth. nent in liquidis, circulando ibidem depo-*  
*cur cap. 57. nentur, & sic fluxus perennitatem produ-*  
*Vesling. cent, quæ Gonorrhœa gallica videtur esse,*  
*d. Lang. sed re vera non est, quia cum muliere non*  
*l. 2. ep. 5. infecta supponitur concubitus &c.*  
*e. 1. de nat. mul.*

Gonorrhœæ ter geminam faciunt di-  
 visionem Medici. Primam quâ dor-  
 mientes per insomnia, aut levi quavis  
 occasione, semineo liquore viri ac mu-  
 lieres. \*, frequentius ac ferè continuò,  
 cum, vel sinè voluptatis sensu foedan-  
 tur. Talis erat ille apud *Rhasim* .a.,  
 & apud *Vesalium* .b. alter. Taliter  
 affectus est Consanguineus meus, eâ de  
 causa infecundus, & ad Tabem dorsalem  
 proclivis absq; luis minima suspicione.  
 Secundam, quâ catarrhi .c., quan-  
 doque etiam cum geniturâ aquosâ, &  
 tenui .d., permisti specie, assiduus mo-  
 lestusque



lestusque contingit fluor ; De quo in mulieribus .e., ac in viris *Hippocrates. f.*

Tertiam demum , quæ ex Lue venerea albidum, vel sub-citrinum virus, quandoque etiam purulentum .g. continuò, nec sinè dolore, præsertim intermingendum, extillat.

Communis Medicorum consensus est primam pendere à tali sanguinis, organorumque genitalium constitutione, ut copiâ .h., calore .i., aut acrimoniâ .l. seminis, sanguine, ac spiritu turgente, Vesiculæ cum adjunctis suis affatim semen emittant ; aut tenui ac evanido existente semine, eadem etiam flaccidæ laxato sphincterulo carunculari \*, extillari sensim sinè sensu .a., aut levi quavis occasione .b., permittant. Fortè etiam obstruuntur quandoque meatus vesicularum, seminale tenuius in sanguinem revehentes.

Secundam à phlegmatis salsi, vel crudi copia, vel putrilagine, organa seminalia imbuente, atque laxante, præcipuè Prostatas in homine, utpotè

*Sam. Polit.*  
1. Velut à  
*cantharid.*  
aut, à ca-  
*thart. pria-*  
*pism. ut*  
*exemp. test.*  
*apud Pla-*  
*ter. l. 1 obs.*  
*med. p. 245*  
*Sinibald.*  
*l. 3 Gene-*  
*anthr. Tr. r*  
*c. 12, &*  
*Tymæum*  
*à Nasturt.*  
*seu sisimbr.*  
*SchenK.*  
*obs. l. 4*

\* *Apud*  
*Gul. Bal-*  
*lon. cons.*  
*med. lib. 3.*  
*cons. pro*  
*Juv. ad Ve-*  
*ner. inutil.*  
*.a. Casum*  
*habes. in*  
*Princ. quo-*  
*dam apud*  
*Cnoefel.*  
*& Theod.*  
*Craanen.*  
*lib. Medic.*  
*3 & Balb.*  
*Tymæum.*  
*cas. med.*



*b. in mict. & egerend. conat. Gul. Ballon. cons. med.* glandulæ sunt crassæ, ac spongiosæ magis. c., in muliere glandulis vaginalibus, vel uterinis, præsertim quoque prostaticis.

Tres Gonorrhœæ species.

*1. Gonorrh. spuria catharr. quotannis est. achyem. redeuntis histor. & curat. hab. apud Boerhaav. med. Sylvat. cons. & resp. med. cent. 3 pro Nob. Forojul. d. Lang.*

*Epist. 5. l. 2. c. 2. VV. VVedel. de S. M. fac. c. 100. & pharm. p. 231. f. Jo. Rioli. Euch. l. 2. c. 39. Steph. Blancar. Inst. Chir. c. 42. de Gon. g. Regn. de Graaf. de mul. org. 9. h. Severin. apud Tb. Barthol. cent. 11. hist. 36. i. Sylv. De le Boë append. tr. 3. res. 332. & seq. l. Andr. Moellenbroch. Eph. Germ. m. VVirsung. n. Rondolet. Pract. l. 2. c. 9. Palmar, 2. de Luc. c. 9. VVelsch. obs. 67 Ballon. Epid. l. 2. p. 160. o. Theod. De Mayer. Tr. de Arthrit. p. Tb. Syden. Epis. 2. resp. ad Hen. Pam. q. Car. Musit. de lue. Ven. lib. 3. cap. 2. de Gon. r. Obs. 52*

In omnibus hisce Gonorrhœis affi-  
ci glandulas urethræ minimè dubita-  
rem. Nimirum quoad primam, legi-  
timamq; Gonorrhœam, unà cum ve-  
sicularum seminalium vitio, illud etiam  
istarum glandularum conjungi, præ-  
ter naturali pariter læsione ac natura-  
li officio utrisque affini, atque com-  
muni.

Glandula-  
rum ure-  
thræ viti-  
um in pri-  
ma.

Quoad secundam par est ratio de  
glandulis urethræ, ac de vaginali-  
bus in fluore albo, atque hanc ure-  
thræ virilis, ac illum uteri coryzam,  
à ferino quodam catarrho cum Bern.  
Valentino .a., appellare possumus, ex  
continuo humoris nutritii abscessu, & fæ-  
tidissima in hisce glandulis corruptione.  
Fur est [ inquit prælaudatus Valenti-  
nus ) Tyrannus ille morbosus, in parti-  
bus glandulosis stabulans, qui non vici-  
nas modò, sed omnes insimul corporis  
humani partes suo defraudans nutrimen-  
to, in putrida hæc liquamina præcipitat.  
Atque hæc perfacile post gonorrhœas  
venereas contingit, facta nimirum  
ad hæc partes viâ, & stimulo ad-  
cas-

In secunda

Theop. Bo-  
net. med  
Septentr.  
part ult. l.  
4. de Mal.  
aff. sect. I.  
obs. I.



easdem proritante, eò maximè quod cum substantia glandularum vesicularis sit, faciliùs distendi potest, tubulique, cum sint tenelluli, faciliùs eroduntur. Idque maximè, si vitium prostatarum adjungatur, non modò in ipsamet glandula ejusque succis, sed & in vasis magno plexu Glandulas complectentibus, quæ sæpiùs varicosa, & polippofo sanguine obstructa, aliquando & calculosis concretionibus impedita comperi. Ab acri urinâ leve aliquod stillicidium seminalis materiæ ortum notat

a. Cons. &  
resp. med.  
Tom. 2  
cent. 3

Raymund. Fortis a.

In tertiâ verò, nimirum virulentâ, Glandulas nostras affici, immò primam has esse morbi hujus sedem, ratio illa manifesta videtur, quam in præfatione attigimus, quòd facilius sit venerea miasmata viciniorem partem, utpote sunt hæ glandulæ, ingredi, quàm, ut prostatæ sunt, remotiorem. Secundò. Quòd satis liqueat, ab hisce glandulis provenire liquorem puriformem posse. Tertiò. Dolor ille, qui per totam urethræ longitudinem persentitur.

tur, non solum ejusdem fundum per  
prostatas, sed totum urethræ tractum  
per glandulas suas affectum esse ma-  
nifestò commonstrat. Quartò. Ex eo  
quòd dolor urgeat ubi confertiores sunt  
glandulæ, nimirum ad urethræ fossu-  
lam. Quintò. Quòd in aliquibus  
gonorrhoeicis cadaveribus nullum in  
prostatibus vitium compererim, sed ure-  
thram dumtaxat phlogosi affectam,  
Disgregatas turgidas, & viroso liquore  
scatentes. Sextò. Nostram confirma-  
re sententiam videtur gonorrhoeâ la-  
borantium duorum cadaverum disse-  
ctio habita à Steph. Blancardo .a., quâ  
Prostatas non semper in vitio esse de  
prehendit, sed vesiculas parvas in in-  
terna penis parte excitatas, purulentam  
que materiam fundentes. Septimò. Aliter  
difficilis admodum esset via quâ vene-  
num hoc gonorrhoeicum viris communi-  
cetur, luculento ejusdem Blancardi. b. te-  
stimonio: *Via, per quas humor iste,*  
*seu potius venenum in prostatas ducitur,*  
*non adeò sunt manifestæ, ideòque res hic*  
*accuratè rimari oportet. Per arterias addu-*  
*cà*

a. , *Inst.*  
*med. Chir.*  
*par. 3. cap.*  
*42 de Go-*  
*norrhœa è*

b. *loc. cit.*



*ci nequit, quia vasa hæc sanguinem quidem adducunt, sed nunquam versùs superiora reducunt; neque venæ esse possunt, quoniam illæ ex omnibus partibus sanguinem superfluum ex tenuioribus vasculis ad majora, & ampliora revebunt: neque nervi, neque vascula lymphatica sunt. Quales itaque vias demonstrabo? &c. Dico me peculiare ignorare vias. Quam-obrem alio quodam modo rem exponit eleganter.*

*In tertiâ  
præsertim.*

*Inventis autem urethræ glandulis res tota in plano est. Supposito enim ex omnibus hujus sæculi Authoribus, in quorum sententiam priores etiam coincidunt, infectum liquamen muliebri particulis salso-acidis tenuibus, ac volatilibus præsertim scatere. Ejusdem vividè tunc agitati halituosa portio quædam in apertam tunc urethram, pariter ac masculi seminis aura in osculum tubasque oterinas, insinuat sese. Atque illius in morem connubit mucoso liquori urethræ superficiei & eidem pertinaciter adhæret, non sinè aliquo inter utrumque liquorem intesti-*

no motu; indeque emicans salina portio tubulos, folliculosque glandularum subit, earumque succis inmiscet sese, membranulas folliculorum stimulo salino corrugat, ab iisque exprimit in folliculi cavitatem copiosius glandulare fluidum; Ac postquam aliquandiu in folliculo nidulaverit, fermentatur, folliculum distendit, folliculat, humorem copiosioremem glandula prolecat, sibiue viam vel rupto canaliculo violenter aperit. Unde rupta, perforata, vel crosa glandularum compage atq; perversa, succoque nutritio expresso, atq; corrupto, copiosus fit, assiduus, & saniosus liquoris profluxus, & velut de glandulis intestinalibus *Cous: depascunt glandulae dum exprimuntur, madorem exprimentes reliqui corporis abundantiam.*

Acris affluens lymphatica, nec non eorum tenerrima vascula erodit, inflammationem, inde exulcerationem excitat.

Lib. de Gland.

Hinc est quod primis ab impuro coitu diebus tensio quaedam in Urethra praesentitur, indeque fermentatis jam liquoribus, auctaque pressione primo semini-formis, inde a core aucto erosio folliculis, nutritius etiam forma

Gonorrhoeae Ven. efficiendi modus.

Q

pu.



puris emanat liquor; qui pro ratione veneni quod suscipitur, ac humorum suscipientis, corruptione remissiore, aut intensiore, ac salium indole, colorem obtinet album, cinereum, flavum, aut subviridem. Quandòque etiam læsis profundius vasis sanguineis, sero commiscetur sanguine affatim tincto, aut factò affluxu humorum vitiosorum disepulotica, aut vitio partis cachectica fit Gonorrhœa.

8. Ab hac Glandularum, & membranarum urethræ distensione, ac ulcerosa diathesi *magnus ille doloris sensus in Pene quoties erigitur: perindè ac si valida manu constringeretur, qui noctu præcipuè urget, quoties in lecto æger cæpit incalescere*. Hinc etiam illa veretri incurvatio, quam *Chordam* vocant, quòd Phlogosi tensâ, & dolorificè contractâ urethrâ, nervosis penis corporibus obsequi minimè possit.

Irritatione velut inflammatione erectionem cōtinuam molientibus.

9. Ità ardor urinae, qui plerumque inter mingendum vix percipitur; at verò æger iam à mictu cessans per omnem uretræ ductum acriter admodum uritur, maxime

mè quàm in glandem definit.

10 Porro sensim diffunditur lues, & prostaticis etiam comunicatur, tuncque Gonorrhœa curatu difficilis & copiosa .b., ac diutina, ut illa Bergo mensis illius apud Th. Bartholinum .c., contingit. Neque ego VUrsingio inficior tria cadavera gonorrhœa extinctorum secanti, in quorum prostaticis vestigia ulcerum, & cicatrices manifestas animadvertit. Ego certè in cadaveribus longâ gonorrhœâ afflictorum ulcera in prostaticis comperi, non ubi tubulatae sunt, sed in eâ prostaticarum productione, quæ brevibus ductulis, apertisque orificiis facili exitu è Granulis glandulosis eructat liquorem limpidum, magis atque serosum, quàm superior, atque globosa portio prostaticarum; de quâ re Observationem habes tertiam. Immò etiâ propagatum, profundius, quæ insertum virus, in prædispositis præfertim corporibus, Phagedenico more, urethram, ac vesicæ collum exedit, atque tum in meatu urinario, tum in cervice vesicæ carneas excrescen-

Progressus  
Gonorr-  
rhœæ .

.b. Uet illa  
apud Andr.  
Mælle-  
BroK in  
aphem.  
Germ.

.c. Cent.  
11. hist. 36.

In Prosta-  
tarum  
apendicem



In Perinæ-  
um.

In Scro-  
tum.

In vesicu-  
las semi-  
nales, &  
Testes.

Hernia  
venerea.

tias producit, ac Perinæum, immò  
, Anum, ac scrotum ulcere fistuloso  
, perforat, unde urina quasi cuniculis  
, factis continenter extillat; Quales  
, ego vidi duos, alterum salivatione  
, mercuriali, ac topicis sanatum, al-  
, terum, quem nulla curare opera  
, potuit, viventem adhuc; & quod  
, mireris, non adeò malè valentem,  
, & Janitoris officium apud Illustris-  
, simum D. Comitem de Verruca Do-  
, minum meum, alacriter fungentem,  
, tresdecim licèt fistulis ad hæc par-  
, tes perfossum.

Quem ad modum etiam vesicu-  
las seminales infestat, immò faciliè  
etiam testibus communicatur, quam  
*Herniam veneris* vocant; ubi victu, mo-  
tu, remediis incrassatur, rarefit, ad-  
stringitur, urgetur infectus seminalis  
liquor; In Testibus ut ibi stagnet, at-  
que distendat; In Prostatis, vesiculis  
seminalibus, aut Deferente, ut in iis-  
dem corrugationem, distensionem,  
pseudo-phlogosim efficiendo impediat  
fluxum à teste; sicque distendantur

in.

intestinula testium, comprimantur ramuli sanguinei, atque lymphatici, ulteriusque distendantur, tandemq; rumpantur. Sed & alius est producendæ Alius Herniæ venereæ modus Herniæ venereæ modus, si glandula conglobata à fundo urethræ, Prostatis, vesiculis seminalibus, Deferente, atque etiam Teste lymphatica recipiens, lympham, aut venereo, aut adstringentium, vel injectorum, vel assumptorum acido, & coagulabilem affatim combibat, eodem modô, ac glandula inguinalis per lymphatica penis venereum venenum absorbet, atque in Bubonem extumescit; ità glandula seminalium Bubone quodam, ità dixerim, extumens, testium vasa lymphatica obstruendo, sanguinea comprimendo, utriusque regressum à teste impediet, cogetque in teste eodem excreescere.

Quòd si verò ulteriorem moram trahat, aut veneni activitatem sorbeat, suæque fracedinis fermento massæ sanguineæ crassim perturbet, tandem Luem veneream per corpus dispergit.

OBSER.



OBSERVATIONES MEDICÆ,  
ET ANATOMICÆ*De Glandularum urethræ  
morbis.*

## I.

Gonor  
rhœa sim-  
plex in  
Puero

**I**lluſtriſſimus Comes N. N. æt. A.  
7 circiter, temperamento ſeroſo-  
acri, conſtitutione molli, tali corri-  
piebatur gonorrhœâ, quâ ſub-albidum  
ac viſcidum quidpiam continuò extil-  
labat, non ſinè ardore inter mingen-  
dum, totiuſque corporis emaciatione.

Repetitis purgationibus ex caſſia  
præſertim; Juſculis demulcentibus ex  
altheâ, malvâ, ſem. melon., tandem  
alKalico-reſinoſis, nimirum ſuccino  
albo præp. & ſtib. diaphor., ex bolo  
conſervæ roſarum, unâ cum juſculis,  
& liquore poſſetico ex lignis ſantal.  
citrin. & ſaſſafr., victuq; humectan-  
te, & abſteſinio, perfectè curabatur.  
His nempè minor crudi diſpeptiq; chi-  
li, adeòque lymphæ ſaſſo-acidæ proven-

tus

tus effectus est, quibus tum succus glandularum, tum urinarum depravabatur.

I I.

**F**ilia Augustini *Aymar* Annorum 7. fluore albo in morem seri la- In Puella.  
ctis nundum clarificati emittebat copiosè, non sine ardore aliquo, & pruritu. Taliter constitutam Nobilem Puellam 9. circiter annorum, repetitis blandis purgantibus, & pulveribus testaceis percuratam vidi.

I I I.

**A**Nno 1702. 15. Aprilis die Sab- Strangu-  
riosus ab  
ulcere cal-  
loso ure-  
thræ.  
bati Tabe consumptus in No-  
socomio S. S. Mauritii, & Lazari obiit  
quidam, cui ad hæc confirmanda ure-  
thram unà cum vesica eximebam, fa-  
vente Illustrissimo D. Paulo *Riccia*  
Medico Regio Primario, & Mecæna-  
te meo optimè merito. Vesicam reperi  
proisus exinanitam atq; contractam,  
in-



intus vasis sanguineis admodum variegatam, uti quoque ad urethræ principium. Paulò infra, nempe ad extremum acutæ productionis carunculæ seminalis, interna urethræ tunica inæqualis apparebat ac aspera, & exsucca, ita ut velut excocta videretur. Hic primum est ubi Prostatas observabam productionem quandam glandularem emittere, sensim gracilescendo ad usq; corporis spongiosi principium, è laterali regione urethræ ad superiorem usq; insistentem; Ex his plurimi emittuntur foras rivuli inordinatâ serie, ita tamen ut totam regionem occupent, quæ prostatarum protuberantiam, & spongiosum tuberculum interjacet, nempe ab infima portione carunculæ seminalis per totum tractum, qui acuta seu rostriformi carunculæ productione dividitur. Hæc autem ostiola in dato subjecto ampliora erant admodum, & velut fossulis excavata. Mox occurrebat portio jam dicta velut excocta, quæ fossulis quoque plurimis excavabatur verè ulcusculosis

culosis abraſa etiam ulcusculis tunicâ.

Paulò infra, nempe ad regionem quâ muscoli constrictores, seu Acceleratores definunt, tota urethra ad altitudinem transversî semidigiti minimi velut callosa erat, ac contracta; Interior membrana verè exesa multis scatebat ulcusculis, liquorem sub viridem, ac virulentum deponentibus. \*

*\*Gangræna  
ſim cum ali-  
quali duri-  
tie contra-  
xerat.*

Conglomeratæ nostræ omnino erant exiguæ, & exsuccæ, & canalis exiguiſſimus, ut eorundem hiatus in urethram nullo modo aparuerit; horum tamen apertio ibi eſſe loci ſolet quâ ulcerofam maximè urethrâ notabamus.

Urethræ reliquum paſſim leviter exoriabatur, ejusque glandulæ diſgregate nihil liquidi emittebant.

Gonorrhœici urethra alterata præfertim ad productionem glanduloſam Proſtatarum infra proceſſum roſtriformē caruncula.

#### IV.

**D**e Iovis 20 Aprilis Anno 1702. Quidam cranio ad medullam incifo, interiori oſſis tabulâ illæſâ poenitūs nullis ſymptomatis ad uſque vigefimam morbi, Indè rigori febre, febri convulſione ſuperveniente, vigefimâ

R secun.



secundâ morbi obiit. Cranio resecto D. *Fassina* S. R. C. Chirurgus primarius, Vir omni virtute scientiâque ornatus, ea quæ prudentissimè conjectatus fuerat, prænoverat, prædixeratque, invenit me præsentem omni veritate veriora; Supra duram meningem nihil occurrebat extravasatum, supra Piam autem, & cerebrum, ad basim usque cerebri ad dextrû hemisphærium fetidissimum pus exundabat. Cum intellexissem hunc Veneri indulgentem, Gonorrhœâ cum ulcusculis venereis detentû, totum Virile unâ cum Vesica eximebam, & primò adnotabam Glandem extremè lividam, cui ad fossulas, quibus ad partem glandis inferiorem ad iatera Frænuli præputium excavatur, duo excitabantur ulcuscula parva, quorum alterum non profundius admodum excavabatur, alterum adusque urethram profundius agebatur, cuniculo velut canali cartilagineo, & fistuloso, qui in ipsa urethræ substantiâ, leviùs tamen desinebat. Apertâ verò urethrâ observabam primò distinctum illud Prosta-

Prostatarum corpus posticum, quod ductus suos ad partem carunculæ superiorem emittebat. Carunculæ seminalis productio rostriformis multos hinc indè ad latera emittebat tubulos, adiacens verò tractus, supra designatus in casu superius exposito, multis scatebat ostiolis à glandosâ prostatarum productione, quæ tamen non adeò crassa erat, ac in casu supra explicato. Morbosi autem ad Gonorrhoeam id fortè erat primò, quod à glande ad medium ferè urethra velut inflammata liveſceret, prope Prostatas verò, & præcipuè in rostriformi productione Carunculæ, aereis vesiculis passim elevaretur, quibus compressis excurrerebat per longum urethræ aereus veluti rivulus, hisque aereis vesiculis urethræ infra prostatas regio adusque corpus spongiosum passim inæqualis, extuberabat. Quoad glandulas verò Prostatas, & glandulas nostras nihil contingebat peculiare.



Gonorrh.  
ab inflam-  
matione  
Disgrega-  
tarum  
Urethræ,

**A**Nno 1703. Præsente Illustrissimo  
D. Ravetti Medico eximio, &  
Fautore meo singularissimo, secabam  
cadaver Gonorrhœici cujusdam, in quo  
urethra omninò inflammatione lives-  
cebat, glandulæque Disgregatæ inmo-  
dicum extumebant.

## VI.

Aneuris-  
ma sinistri  
canalis  
Adstitum  
conglome-  
tatarum:

**F**Avente eodem Promotore meo  
stranguriosus quidam Annorū 13. aut  
14. vix puber, cadaver mihi suum se-  
candum reliquit, & in urethrâ miram  
stranguriæ causam obtulit. Nempe ad  
radicem urethræ ad regionem Accele-  
ratorum occurrebat vesicula instar sac-  
culi oblonga ferè pyriformis, nisi quod  
subrotundum alioquin fundum trans-  
versus sulcus angustaret, atque divide-  
ret, cujus pedunculus urethræ versùs  
Prostatas, reliquum corpus per longi-  
tudinem urethræ porrigebatur, ut ejus-  
dem

dem fundus illius apicem spectaret. Cœcus undequaque in urethræ cavitationem erat sacculus, tenui membranâ pellucidus; apertus liquorem pellucidum, atque glutinosum effundebat ad semicochlear ferè. Insuflatus per sectionem in sacculum aer nullo in cavitationem urethræ hiatu perspirabat; at quidem versùs Adstitem sui lateris conglomeratam conversò siphunculò flatus ad Glandulâ usque pertingebat, eodemque modo immissus etiam stilus pergebat. Adeoque constitit Sacculum illum membranosum nihil aliud esse quàm sinistri canalis Adstitis conglomeratæ Aneurisma ab ejusdem canalis obstructione, ad urethræ ingressum facile ob enarrata superiùs impedimenta contingente; Velut in ductibus naso lachrymalibus, atque etiam salivalibus quandoque contingit. De cætero Vesica distenta enormiter atque inflammata, ejusque cervix nigrosi affecta, caruncula seminalis lacerata. Quæ ostendere curavimus, licèt imperitiùs, excusa.



## F I G U R A I.

**A** Vesicæ urinariæ versùs collum portio (reliquo corpore ablato) inflammata, ac vasis sanguineis plurimis variegata.

**B.** Caruncula repetitò cathetere lacerata.

**C.** Adstitum conglomeratarum canalis dexter naturaliter constitutus.

**D.** Vesicula ex sinistro Adstitum conglomeratarum canali occluso eformata.

**EE.** Prostata in principio Pubertatis, & per expressionem multiplicem inter micturitiones factam, exsuccæ.

**FF.** Musculi Ejaculatores.

**GG.** Urethra non-nihil inflammata.

**HH.** Corpus Glandis.

## F I G U R A I I.

**A** Ppositâ tabulâ exhibetur Vesica urinaria humana, unâ cum Urethra virili, ablatiis nervosis Corporibus, per longitudinem superiorem à Glandis extremo ad usque Vesicam diffissa, omnia naturali magnitudine picta. Præcipuè tamen animus fuit exhi-

exhibere glandulas Urethræ Conglomeratas cum canalibus suis, & Disgregatarum per Urethrę longitudinē ostiola, & canaliculos varios, nec non Antiquorum Cervicis Vesicæ Sphincterem. Reliqua ad Figuræ complementū potius, quā ad rem meā adde bā.

**A.** Vesica urinaria anteriùs e regione Cervicis ad usque medium secta.

**a.** Vesicæ Fundus.

**B.** Cervix.

**CC.** Ureteres.

**cc.** Ureterū obliquus in Vesicā ingressus

**DD.** Vasa Deferentia.

**dd.** Vasa ad Vesiculas seminales excurrentia.

**EE.** Vesiculæ seminales.

**F.** Urethræ principum.

**G.** Caruncula seminalis cum duobus ostiolis Ejaculatoriis.

**g.** Carunculæ acuta seu rostriformis productio.

**HH.** Prostata.

**II.** Musculus statim infra Prostatarum protuberantiam Urethrę super extensus, seu Pseudo Sphincter, utrinque revolutus.



ii. Urethræ portio huic Musculo sub-  
jecta.

K. Tuberculum spongiosum Urethræ  
appensum.

L. Musculorum Acceleratorum alter  
ad maiorem claritatem appositus.

MM. Adstites Conglomeratæ.

mm. Earum Ductus Urethræ superfi-  
ciem excurrentes.

NN. Horum ductuum orificia suillam  
setam minorem ad usque Glandulas  
insinuandam admittentia.

nnnn. Minores Ductus, parvaque Orifi-  
cia Disgregatarum Urethræ  
Glandularum.

OO. Majores Glandularum Disgregata-  
rum ductus setulam excipientes.

o. Ductus medius ad Glandis osculū  
setulam tenuissimam admittens.

PP. Nervosa Urethræ Tunica.

pp. Tunica media spongiosa.

QQ. Exterior fibrosa.

RR. Glans per medium ad partem  
superiorem secta.

rr. Glādis labellā diuiso Urethrę osculo

S. Cavcrnula Urethrę, Glandi subiecta.

F I N I S.



